

亚东部和南部也有引种。

7. 二岐山蚂蝗

Desmodium dichotomum (Willd.) DC. Prodr. 2: 336. 1825; van Meeuwen in Reinwardtia 6: 248. 1962; Ohashi in Ginkgoana 1: 173. 1973. — *Hedysarum dichotomum* Willd. Sp. Pl. 3(2): 1180. 1803. — *H. diffusum* Willd. l. c. — *Desmodium diffusum* (Willd.) DC. Prodr. 2: 336. 1825. nom. illegit, non P. 335 n. 88. quae est *Desmodium laxiflorum* DC.

披散草本或亚灌木，茎高 20—80 厘米。基部木质，分枝及茎明显具棱，被贴伏长直毛和伸展钩状毛。叶为羽状三出复叶，有时近茎基部具 1 小叶；托叶宿存，抱茎，三角形，长 4—10 毫米，基部宽 1.5—5 毫米，先端锐尖至渐尖，基部明显偏斜，心形，具明显的耳，无毛或近无毛，具线纹；叶柄长 1.5—3.5 厘米，被毛；小叶厚纸质，顶生小叶椭圆形或卵形至宽椭圆形或宽卵形，长 1.5—7 厘米，宽 1—6 厘米，侧生小叶略小，先端圆或钝，基部圆或心形，但侧生小叶基部常为斜圆形，上面疏被贴伏毛和混有少数钩状毛，下面密被贴伏毛，全缘，侧脉每边 8—13 条，直达叶缘处；小托叶三角形或卵形，长 2—7 毫米，宽 1—2 毫米；小叶柄长 1—2 毫米。总状花序顶生和腋生或通常为顶生圆锥花序，长 5—45 厘米，总花梗被钩状毛，花稀疏，每 2—3 朵生于花序节上；苞片狭卵形，长 2—3 毫米，宿存，外面被毛，内面无毛，无小苞片；花梗长 2—5 毫米，被毛；花萼漏斗形，长约 2 毫米，密被长直毛和短钩状毛，4 裂，裂片狭三角形，长约 1 毫米，与萼筒等长，上部裂片 2 裂；花冠紫色至堇色，长约 3 毫米，旗瓣倒卵形或宽倒卵形；基部有短瓣柄；翼瓣、龙骨瓣具短瓣柄；雄蕊二体，长约 3 毫米；雌蕊长约 3 毫米，子房密被柔毛，有胚珠 5—6。荚果狭长圆形，长 10—18 毫米，宽 2.5—3 毫米，密被钩状毛，腹背缝线浅缢缩，略呈念珠状，有荚节 5—6。荚节近方形至长圆形，长约 2.5 毫米，多少具网脉。花期 6—8 月，果期 9—10 月。

产云南南部。生于灌丛中或林中。印度、缅甸、马来西亚也有分布。

组 2. 大叶山蚂蝗组 Sect. *Heteroloma* Benth. in Miq. Pl. Jungh. 224. 1852. in adnot. pro parte incl. ser. *Strobilacea* Benth. ser. *Latifolia* Benth. et ser. *Laxiflora* Benth. pro parte excl. spp. cit. *D. sequax* et *D. megaphyllum*; in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 520. 1865. incl. ser. *Strobilostachys* Benth. et ser. *Leptostachys* Benth. excl. ser. *Podocarpia* Benth. et ser. *Nephromeria* Benth.

托叶对称，基部不为耳状，不抱茎。萼 4 裂，裂片近等长，与萼筒等长或稍短，上部裂片先端 2 裂。荚果腹缝线稍直，背缝线深波状。

组后选模式种：大叶山蚂蝗 *D. gangeticum* (Linn.) DC. (*Hedysarum gangeticum* Linn.)

本组我国产 4 种，1 变种。