

产四川、云南。生于山坡石砾地或林内，海拔1700—3100米。模式标本采自四川盐源雅砻江流域。

23. 美花山蚂蝗

Desmodium callianthum Franch. Pl. Delav. 173. 1890; Schindl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 22: 267. 1926 et in Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 570. 1933. — *D. elegans* DC. subsp. *callianthum* (Franch.) Ohashi in Hara, Fl. E. Himal. 2: 291. 1971 et in Ginkgoana 1: 110. 1973.

灌木，高达2米。多分枝，幼枝具棱角，几无毛。叶为3小叶的复叶；托叶钻形，长约5毫米，宽1毫米，脱落；叶柄长1—3厘米，纤细，疏被短柔毛或近无毛；小叶纸质，卵状菱形或卵形，顶生小叶长1.3—4厘米，宽1—3厘米，先端钝尖，有短尖，基部宽楔形，侧生小叶略小，基部稍偏斜，小叶上面被极短柔毛，下面苍白色，初时沿脉上疏生柔毛，后渐变无毛，全缘，侧脉每边4—5条，直达叶缘，两面皆隆起；小托叶刺毛状，长1毫米；小叶柄长1毫米，被短柔毛。总状花序顶生，或分枝组成圆锥花序，长15—22厘米，总花梗疏被短柔毛或近于无毛；花2—4朵生于每一节上，节间长约1厘米；苞片狭卵形，长约2毫米，早落；花梗丝状，长约7毫米，近无毛或无毛；花萼长约3毫米，4裂，裂片三角形，长1.2毫米，等长，较萼筒短，萼筒长约1.8毫米，近无毛；花冠紫色或粉红色至白色，长8—10毫米，旗瓣宽椭圆形，先端圆形，不微凹，基部具短瓣柄，翼瓣具耳和瓣柄，龙骨瓣先端有细尖，基部有耳和瓣柄；雄蕊长7—8毫米；雌蕊长8—9毫米，被贴伏丝状毛，花柱无毛。荚果扁平，长3—5厘米，宽约5毫米，稍弯曲，腹缝线于节间稍缢缩，背缝线缢缩呈圆齿状，有荚节5—6，荚节长约6毫米，具网纹，近于无毛或被微柔毛。花期6—8月，果期8—10月。

产云南西北部、四川西部及西南部、西藏东南部。生于山坡路旁、灌丛、林中、水沟边或河谷侧坡砾石堆上，海拔1700—3300米。模式标本采自云南鹤庆大槽。

本种旗瓣先端圆形，不微凹，龙骨瓣先端有细尖，花与小叶均较小，易识别。

24. 狭叶山蚂蝗

Desmodium stenophyllum Pampan. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 17: 15. f. 4. 1910; Schindl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 22: 167. 1926. — *D. tiliifolium* var. *stenophyllum* (Pampan.) Schindl. in Engl. Bot. Jahrb. 54: 60. 1916. — *D. elegans* DC. subsp. *stenophyllum* (Pampan.) Ohashi in Hara, Fl. E. Himal. 2: 291. 1971 et in Ginkgoana 1: 110. 1973.

灌木，高1—2米。除小叶柄外，全无毛，老枝灰色。叶为三出复叶，小叶3；托叶卵形，长约5毫米，宽约1毫米，早落；叶柄长2—5厘米，较纤细，上面具沟槽；小叶纸质，披针形或披针状线形，顶生小叶长6—13厘米，宽1.2—3厘米，先端渐尖，基部宽楔形或近圆形，侧生小叶略小，长3—12厘米，宽1—2厘米，上面绿色，下面苍白色，全缘，侧脉每边6—9条，直达叶缘，两面隆起；小托叶刺毛状，长约2毫米；小叶