

出复叶，小叶3；托叶钻形，长约7毫米，基部宽0.5—1毫米，外面与边缘被毛；叶柄长2—12厘米，着生茎上部的叶柄较短，茎下部的叶柄较长，疏被伸展短柔毛；小叶纸质，顶生小叶宽倒卵形，长4—7厘米，宽3.5—6厘米，先端凸尖，基部楔形或宽楔形，全缘，两面疏被短柔毛或几无毛，侧脉每边约4条，直达叶缘，侧生小叶斜卵形，较小，偏斜，小托叶丝状，长1—4毫米；小叶柄长1—2厘米，被伸展短柔毛。总状花序或圆锥花序，顶生或顶生和腋生，长20—30厘米，结果时延长至40厘米；总花梗被柔毛和钩状毛；通常每节生2花，花梗长2—4毫米，结果时增长至5—6毫米；苞片早落，窄卵形，长3—5毫米；宽约1毫米，被柔毛；花萼钟形，长约2毫米，裂片极短，较萼筒短，被小钩状毛；花冠紫红色，长约4毫米，旗瓣宽倒卵形，翼瓣窄椭圆形，龙骨瓣与翼瓣相似，均无瓣柄；雄蕊单体；雌蕊长约3毫米，子房具子房柄。荚果长约1.6厘米，通常有荚节2，背缝线弯曲，节间深凹入达腹缝线；荚节略呈宽半倒卵形，长5—10毫米，宽3—4毫米，先端截形，基部楔形，被钩状毛和小直毛，稍有网纹；果梗长约6毫米；果颈长3—5毫米。花、果期8—9月。

产河北、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃等省区。生于山坡路旁、草坡、次生阔叶林下或高山草甸处，海拔120—2100米。印度、朝鲜和日本也有分布。

4b. 宽卵叶长柄山蚂蝗（变种） 假山绿豆（海南植物志），宽卵叶山蚂蝗（中国主要植物图说·豆科），东北山蚂蝗（中国主要植物图说·豆科） 图版9: 3

var. *fallax* (Schindl.) Yang et Huang in Bull. Bot. Lab. North-East Forest. Inst. no 4: 8. 1979. — *Desmodium fallax* Schindl. in Engl. Bot. Jahrb. 54: 55. 1916; 中国主要植物图说·豆科499. 图495. 1955; 海南植物志2: 275. 1965. — *D. podocarpum* DC. var. *mandshuricum* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb. 31: 30. 1886. — *D. mandshuricum* Nakai in Mori, Enum. Pl. Cor. 214. 1922. — *D. fallax* Schindl. var. *mandshuricum* (Maxim.) Nakai in Bot. Mag. Tokyo 44: 32. 1930; 东北草本植物志5: 129. 图版57: 4—6. 1976. — *D. racemosum* (Thunb.) DC. var. *mandshuricum* (Maxim.) Ohwi, Fl. Jap. 638. 1953. — *D. oxyphyllum* var. *mandshuricum* (Maxim.) Ohashi in Journ. Jap. Bot. 41: 155. 1966. — *D. podocarpum* DC. subsp. *fallax* (Schindl.) Ohashi in Hara, Fl. E. Himal. 2: 65. 1971 et in Ginkgoana 1: 149. 1973.

顶生小叶宽卵形或卵形，长3.5—12厘米，宽2.5—8厘米，先端渐尖或急尖，基部阔楔形或圆，是与原变种主要区别之点。

产东北、华北（除山东）至陕、甘以南各省（除西藏）。生于山坡路旁、灌丛中疏林中，海拔300—1350米。朝鲜、日本也有分布。

全草供药用，可祛风、活血、止痢，并可作家畜饲料。

4c. 尖叶长柄山蚂蝗（变种） 山蚂蝗（中国主要植物图说·豆科），小山蚂蝗（台



图版 9 1—2. 长柄山蚂蝗 *Podocarpum podocarpum* (DC.) Yang et Huang var. *podocarpum*: 1. 果枝, 2. 叶片。3. 宽卵叶长柄山蚂蝗 *P. podocarpum* (DC.) Yang et Huang var. *fallex* (Schindl.) Yang et Huang: 叶片。4. 尖叶长柄山蚂蝗 *P. podocarpum* (DC.) Yang et Huang var. *oxyphyllum* (DC.) Yang et Huang: 叶片。5. 四川长柄山蚂蝗 *P. podocarpum* (DC.) Yang et Huang var. *szechuanense* (Craib) Yang et Huang: 叶片。(许芝源绘)