

31. 舞草属* *Codariocalyx* Hassk.

Hassk. in Flora 25. Beibl. 2: 48. 1842. pro parte excl. sp. cit.
C. capitatus (DC.) Hassk. quae est *Desmodium styracifolium*
 (Osbeck) Merr.; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 479. 1964. — *Desmodium*
 Sect. *Pleurolobium* DC. Prodr. 2: 326. 1825. pro parte incl.
 subsect. *Gyrantia* DC. pro parte excl. sp. cit. — *D. timoriense*
 DC. quae est. *Pseudarthria viscida* Wight et Arn. — *D.* subgen.
Pleurolobium Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 174. 1876.

直立灌木。叶为三出复叶，侧生小叶很小，或缺而仅为单小叶；有托叶和小托叶，托叶早落。圆锥状或总状花序顶生或腋生；苞片宽卵形，密集，覆瓦状排列，具线纹，小苞片缺；花萼膜质，宽钟形，5裂，上部2裂片合生但先端明显2裂；花冠较花萼长，旗瓣通常偏斜，近圆形，基部具小瓣柄，翼瓣近半三角形，先端圆形，基部有耳，龙骨瓣镰刀状，较翼瓣长；雄蕊二体；雌蕊线形，有胚珠6—13；荚果有荚节5—9，腹缝线直，背缝线稍缢缩，成熟时沿背缝线开裂，被毛，无网脉；种子具假种皮；子叶出土萌发。

属模式种：舞草 *Codariocalyx motorius* (Houtt.) Ohashi (*Hedysarum motorius* Houtt.)

本属仅2种，分布东南亚和热带澳洲。我国均产。

舞草属分种检索表

1. 顶生小叶长椭圆形或披针形，长5.5—10厘米，宽1—2.5厘米；荚果疏被钩状短毛 1. 舞草 *C. motorius* (Houtt.) Ohashi
1. 顶生小叶倒卵形或椭圆形，长3.5—5厘米，宽2.5—3厘米；荚果密被黄色短钩状毛和长柔毛 2. 圆叶舞草 *C. gyroides* (Roxb. ex Link.) Hassk.

1. 舞草 (酉阳杂俎) 钟萼豆 (台湾植物志) 图版 10: 7—9

Codariocalyx motorius (Houtt.) Ohashi in Journ. Jap. Bot. 40: 367. 1965. incl.
 var. *roylei* (Wight et Arn.) Ohashi in Hara, Fl. E. Himal. 125. 1966, et 2:
 63. 1971; 台湾植物志 3: 214, 图 545. 1977. — *Hedysarum motorius* Houtt. in Nat.
 Hist. 2 (10): 246. 1779. — *H. gyrans* Linn. f. Suppl. 332. 1781. — *Desmodium*
gyrans (Linn. f.) DC. Prodr. 2: 326. 1825; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2:
 174. 1876: incl. var. *roylei* (Wight et Arn.) Baker; 中国主要植物图说·豆科 501.

* 属的异名：钟萼豆属 (台湾植物志)。