

筒长；花冠紫色，比花萼长1—2倍。荚果有反复折叠的荚节4—7，荚节扁平，灰褐色，略有网纹，有毛。花、果期10—11月。

产海南、云南南部。生于路旁、山坡、海拔900米以下。印度、斯里兰卡、马来半岛北部等也有分布。

7. 长苞狸尾豆 图版12: 1—5

Uria longibracteata Yang et Huang in Bull. Bot. Res. 1: 14. 1981.

直立灌木。枝圆柱形，密被灰黄色开展粗硬毛。叶为羽状三出复叶；托叶三角形，长约1厘米，宽2毫米，外面密被长柔毛和缘毛，先端锥尖，脱落；叶柄长1.5—1.7厘米，密被灰黄色粗硬毛；小叶硬纸质，卵形、近圆形或长圆形，顶生小叶长3—6厘米，宽2.7—4.5厘米，侧生小叶略小，长2.2—4.5厘米，宽1.5—3厘米，先端圆或微凹，具细尖，基部圆或宽楔形，上面被灰色糙伏毛，下面密被柔毛，侧脉每边9—11条，两面隆起，具密网脉；小托叶刺毛状，长4—5毫米，被灰色长柔毛，小叶柄长1毫米，密被灰黄色毛。圆锥花序顶生，长10—25厘米，花序轴密被灰黄色长柔毛；花密接，2朵簇生；苞片长卵形，中部以上突然收缩成长尾尖，长约9毫米，宽2.5—3毫米，外面被灰黄色柔毛和缘毛；花梗长1—1.2厘米，先端弯曲，被开展灰黄色长柔毛；花萼裂片5，刺毛状，长2.5毫米，具长柔毛，上部2裂片较短，萼筒短，长1.5毫米；花冠紫色，长5毫米；雄蕊二体，长4毫米；子房无毛。荚果长5—6毫米，有反复折叠的荚节5—7，荚节无毛。花、果期9—11月。


产福建（永安）、广东北部、广西（河池）。生于山坡、路旁、田边，海拔500米以下。模式标本采自福建永安。

8. 滇南狸尾豆

Uria lacei Craib in Kew Bull. 1910: 276. 1910.

直立灌木，高约1.5米。茎圆柱形，具纵条纹，粗壮，分枝亦粗壮，被黄色绒毛。叶为羽状三出复叶；托叶长卵形，长约1厘米，先端钻形，密被锈色绒毛和柔毛；叶柄长2—4.5厘米，粗壮，具沟槽，基部膨大，被黄色开展柔毛；小叶纸质，长圆形或卵状披针形，顶生小叶长达16厘米，宽约8厘米，侧生小叶略小，长10—15厘米，宽3.8—7厘米，先端钝圆，具细尖，基部圆形，侧生小叶基部两侧常不对称，全缘或有时浅圆波状缘，上面被疏毛，下面被白色长柔毛，侧脉每边约13条；小托叶刺毛状，长约4毫米；小叶柄长约3毫米，密被锈色绒毛。圆锥花序顶生，长42厘米，花序轴被锈色绒毛和开展长柔毛；苞片卵形或圆卵形，长7毫米，宽5毫米，外面被黄色柔毛；花梗较纤细，长约7毫米，被柔毛；花萼长约4毫米，5裂，裂片披针形，尖锐，与萼筒等长，上部2裂片较短；旗瓣长约6.5毫米。荚果有荚节6，几无毛。花期10月。

产云南南部。生于河边路旁，海拔800—1350米。印度、缅甸也有分布。



图版 12 长苞狸尾豆 *Uraria longibracteata* Yang et Huang: 1. 果枝, 2. 中部叶片, 3. 荚果, 4. 花外形, 5. 苞片。(张桂芝绘)