

至中部增大，较子房长 8—10 倍，柱头头状。荚果褐色，被短毛，有荚节 2—3，每节具 1 种子；种子肾形，长约 2 毫米，宽 1.5 毫米。花期 5—6 月，果期 8—9 月。

产广西隆林、百色、田林等地。散生于山地阳坡、路旁杂草中，海拔 1 000 米以下。越南、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸、印度也有分布。

2. 短序算珠豆 图版 14: 1—11

Urariopsis brevissima Yang et Huang in Bull. Bot. Lab. North-East Forest. Inst. no. 8: 7. 1980.

直立亚灌木，高达 1 米。茎和枝密被黄色绒毛和疏被开展白色直柔毛。叶具单小叶；托叶早落；叶柄长 2—3.5 厘米，密被黄色绒毛和开展柔毛；小叶纸质，全为心形，长 5.5—10 厘米，宽 5—8 厘米，先端急尖，具锐尖头，细尖长 1.5—2 毫米，基部心形，两面被开展柔毛，侧脉每边 8—10 条，两面隆起；小托叶窄三角形，长 6—6.5 毫米，宽 1.5 毫米，先端长渐尖，干膜质，具条纹，疏生硬毛。总状花序短，腋生或顶生，无分枝或下部具 1 分枝，果序长 4—5 厘米，序轴密被黄色和开展直柔毛；密花，每节生 2 花；生花节间长约 3 毫米；苞片近圆形，长 2.5—4 毫米，中部以上突然收窄而成一长尾尖，干膜质，具条纹，外面疏被硬毛，内面无毛；花梗长 12—13 毫米，被开展黄色长柔毛；花萼 5 裂，裂片披针形，长达 3 毫米，上部 2 裂片合生，被长柔毛；萼筒短，长 1.5 毫米；旗瓣倒卵形，长 7.5—8 毫米，翼瓣镰状长圆形，长 6 毫米，龙骨瓣镰状长圆形。雄蕊二体，长 7 毫米；子房长 3 毫米，被极短贴伏小柔毛，有胚珠 3—4，花柱长 6 毫米。荚果 3—4 节，荚节直径约 3 毫米，具皱纹，被贴伏小柔毛；果梗先端明显下弯。花、果期 10—12 月。

产广西（那坡）、云南（屏边、河口）。生于山地或干燥草地，海拔 130—500 米。模式标本采自云南屏边。

本种花序极短，叶全为心形，先端急尖，具长 1.5—2 毫米的细尖。易区别于前种。

37. 蝙蝠草属* *Christia* Moench.


Moench, Meth. Suppl. 39. 1802; Hutch. Gen. Fl. Pl. 1: 481.

1964. — *Lourea* Neck. Elem. 3: 17. 1790. nom., illeg. non St.

Hilaire 1812.

直立或披散草本或亚灌木。叶为羽状三出复叶或仅具单小叶；具小托叶。花小，组成顶生总状花序或圆锥花序，少数为腋生花序；花萼膜质，钟状，结果时增大，5 裂，裂片卵状披针形，与萼筒等长而略宽；花冠与花萼等长或较长，旗瓣宽，基部渐狭成瓣柄，翼瓣与龙骨瓣贴生，龙骨瓣钝；雄蕊二体 (9+1)，花药一式；子房有胚珠数颗，花柱线

* 属的异名：- 罗蓝草属（中国主要植物图说·豆科）。



图版 14 短序算珠豆 *Urariopsis brevissima* Yang et Huang: 1. 果枝, 2. 苞片外面, 3. 苞片内面, 4. 花萼, 5. 旗瓣, 6. 翼瓣, 7. 龙骨瓣, 8. 雌蕊, 9. 雄蕊, 10. 荚果, 11. 种子. (张桂芝绘)