

米，宽 2.5 毫米，先端钝，基部耳状，具长瓣柄，龙骨瓣长 9 毫米，宽 2 毫米，钝头；子房被疏柔毛，有柄。荚果未见。 花期 6—9 月。

产云南、四川。生于海拔 2 200—2 800 米山坡灌丛中。模式标本采自云南丽江。

16. 多花胡枝子 (东北木本植物图志) 图版 38: 1—8

Lespedeza floribunda Bunge Pl. Mongh.-Chin. 1: 13. 1835; Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29: 415. 1901; Pampan. Nouv. Giorn. Bot. Ital. n. s. 17: 399. 1910; Lév. Fl. Kouy-Tchéou 236. 1914—15; id. Cat. Pl. Yunnan 158. 1916; Schindl. in Sargent, Pl. Wils. 2: 105. 1916. pro parte; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 572. 1933; 东北木本植物图志 345. 图版 116: 257. 1955; 中国主要植物图说·豆科 525, 图 519. 1955; 中国高等植物图鉴 2: 462. 图 2653. 1972; 云南种子植物名录上册, 613. 1984. — *L. floribunda* Bunge var. *alopecuroides* Franch. Pl. Delav. 169. 1889.

小灌木，高 30—60 (—100) 厘米。根细长；茎常近基部分枝；枝有条棱，被灰白色绒毛。托叶线形，长 4—5 毫米，先端刺芒状；羽状复叶具 3 小叶；小叶具柄，倒卵形，宽倒卵形或长圆形，长 1—1.5 厘米，宽 6—9 毫米，先端微凹、钝圆或近截形，具小刺尖，基部楔形，上面被疏伏毛，下面密被白色伏柔毛；侧生小叶较小。总状花序腋生；总花梗细长，显著超出叶；花多数；小苞片卵形，长约 1 毫米，先端急尖；花萼长 4—5 毫米，被柔毛，5 裂，上方 2 裂片下部合生，上部分离，裂片披针形或卵状披针形，长 2—3 毫米，先端渐尖；花冠紫色、紫红色或蓝紫色，旗瓣椭圆形，长 8 毫米，先端圆形，基部有柄，翼瓣稍短，龙骨瓣长于旗瓣，钝头。荚果宽卵形，长约 7 毫米，超出宿存萼，密被柔毛，有网状脉。 花期 6—9 月，果期 9—10 月。


产辽宁 (西部及南部)、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、青海、山东、江苏、安徽、江西、福建、河南、湖北、广东、四川等省区。生于海拔 1 300 米以下的石质山坡。模式标本采自北京附近。

L. H. Bailey (in Genet. Herbarum 1: 32. 1920) 曾发表鸡公山 (湖北及河南省交界) 一种 *Lespedeza stolliae* Bailey, 与本种极相似，叶卵形；花紫堇色，长 7—10 毫米，该种原记载虽有图，但花序不全 (果未见)，我们尚未见到此种标本，暂录于此，供今后调查研究参考。

另外，A. K. Schindler (in Fedde, Reprt. Sp. Nov. 10: 404. 1912)，据四川产标本，曾发表 *Lespedeza dielsiana* Schindl. 据原始记载，其幼时外形颇似本种。由于我们未见到标本，亦录于此，供今后参考。

17. 细梗胡枝子 (中国主要植物图说·豆科)

Lespedeza virgata (Thunb.) DC. Prodr. 2: 350. 1825; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 25: 183. 1886—88; Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29: 415. 1801; Kom. in Act. Hort. Petrop. 22: 608. 1904; Lév. Fl. Kouy-Tcheou 237. 1914—15; Schindl. in Sargent, Pl. Wils. 2: 110. 1916; 中国主要植物图说·豆科 526.



图版 38 1—8. 多花胡枝子 *Lespedeza floribunda* Bunge: 1. 植株下部, 2. 植株上部, 3. 旗瓣, 4. 翼瓣, 5. 龙骨瓣, 6. 雄蕊和雌蕊, 7. 花萼, 8. 荚果及宿存萼。9—11. 细梗胡枝子 *L. virgata* (Thunb.) DC. var. *virgata*: 9. 花序枝的一段, 10. 花萼, 11. 荚果及宿存萼。(张桂芝绘)