

倒卵形，长 7—13 厘米，宽 4—6.5 厘米，先端近截平，具短芒尖，基部宽楔形或钝，上面被疏长伏毛，下面沿脉上被长伏毛，其余被微毛；侧脉 8—9 对，直或至边缘弯拱，两面凸起，小脉网状，下面稍裸露；小叶柄长 4—5 毫米，被长伏毛；小托叶钻状，长 5—7 毫米。圆锥花序腋生或顶生，长 15—20 厘米，花序轴和花梗被短柔毛；苞片早落；小苞片线形，长约 1 毫米；花梗长 3.5—4.5 毫米，比花萼略短；花萼钟形，长 5—5.5 毫米，两面被短柔毛，上面 2 齿多少合生，下面 3 齿卵状披针形或中央 1 齿披针形，长 2.5—2.7 毫米；花瓣紫色，旗瓣圆形，长和宽约 7 毫米，先端微凹，基部楔形，瓣柄长约 2 毫米；翼瓣近匙形，长 5—5.5 毫米，顶部宽 3—3.5 毫米，基部一侧稍具钝耳，瓣柄长 4.5—5 毫米；龙骨瓣长圆形或上部稍宽，长 3.5—4 毫米，背部弯拱，稍连合，先端钝圆，基部一侧略具钝耳，瓣柄长约 4.5 毫米；花药圆形，5 大 5 小；子房狭长圆形，长 4.5 毫米，被短柔毛，花柱短，微弯，被毛，柱头头状。荚果长 6—9 厘米，先端稍狭而略弯，具短尖喙，基部无果颈。春季开花。

产于云南思茅。生于海拔 1 600 米的高山林中。

8. 双耳密花豆 (植物研究)

Spatholobus biauritus Wei in Bull. Bot. Res. 5: 51. 1985.

攀援藤本。叶具 3 小叶；叶柄长 5.5—6.5 厘米，被长柔毛；小叶纸质，近同形，长倒卵形或倒披针形，长 7—9.5 厘米，中部宽 3—4 厘米，先端圆或近截平，具短芒尖，基部狭楔形，上面被疏长伏毛，下面沿脉上被长伏毛，其余被微毛；侧脉 8—10 对，直或至边缘弯拱，两面凸起，小脉网状，两面明显；小叶柄长约 4 毫米，被长伏毛；小托叶钻状，稍短于小叶柄或与其等长。圆锥花序顶生，长达 30 厘米，总轴延伸，分枝短而疏散；苞片卵状三角形，先端渐尖，长约 2 毫米，早落；小苞片线形，长约 1 毫米；花紫红色，花梗略短于花萼；花萼钟形，长 5—5.5 毫米，外面被短毛，里面的毛较长，萼齿短过萼管，上面 2 齿多少合生，微凹，下面 3 齿卵形，先端钝或略尖；旗瓣圆形，长和宽 6—7 毫米，先端微凹，基部楔形，瓣柄长 2—2.5 毫米；翼瓣长圆形，长约 5.5 毫米，基部上侧具 1 圆耳，下侧具 1 长圆形耳垂，瓣柄长约 4 毫米；龙骨瓣比翼瓣短，长约 4 毫米，基部一侧具钝长耳垂，瓣柄长 3.5—4 毫米；花药近圆形，5 大 5 小；子房狭长圆形，长 3—4 毫米，近无柄，花柱短，微弯，柱头小，头状。果未见。花期 4 月。

特产于云南景东。生于海拔 1 400 米的山地林中。

9. 耿马密花豆 (植物研究) 图版 48: 1—6

Spatholobus gengmaensis Wei in Bull. Bot. Res. 5: 53. 1985.

攀援藤本。叶具 3 小叶；叶柄圆柱形，长约 6.5 厘米，几无毛；小叶大，近革质，异形，顶生的倒卵状长圆形，长约 27 厘米，宽约 13.5 厘米，两侧对称，侧生的卵状椭圆形，比顶生的略短小，两侧不对称，先端钝圆，具一短尖头，基部圆形，上面无毛，下面除中脉、侧脉被疏长毛外，其余无毛；侧脉 6—7 对，微弯，两面凸起；小叶柄粗壮，长 5—6 毫米；小托叶钻状，与小叶柄等长或稍短。圆锥花序腋生，长约 27 厘米，花序轴和