

2 毫米；小托叶针状，长 1—1.5 毫米。总状花序腋生，花序轴纤细，长 2—10 厘米，单生或孪生；小苞片卵状披针形，被毛；花具短梗；花萼长约 7 毫米，几无毛，萼管长约 3 毫米，裂片狭披针形，先端尖；花冠淡蓝色，旗瓣倒卵形，长约 10.5 毫米，宽约 7 毫米，先端圆，基部渐狭，具小耳；翼瓣长圆形，长约 9 毫米，宽约 2 毫米，基部具尖耳；龙骨瓣稍长于翼瓣，背部微弯，基部具小耳；对旗瓣的 1 枚雄蕊完全离生，花药长圆形；子房无柄，扁平，密被长柔毛，有胚珠约 10 颗，花柱突出，顶部弯，无毛。荚果线形，长 2—4 厘米，宽 6—7 毫米，初时被长柔毛，后渐变无毛；种子肾形，稍扁，长 2—3.5 毫米，宽 3—5 毫米，棕褐色，光滑。 花、果期 8—9 月。

产于台湾、广东、江西、湖南、广西、云南等省区。生于林中或村边丘陵灌丛中。印度、斯里兰卡、马来亚、泰国、越南、菲律宾等也有分布。

3. 台湾乳豆 (台湾植物志) 乳豆 (海南植物志、中国高等植物图鉴)

Galactia formosana Matsumura in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 12: 424. 1899; Matsumura & Hayata, op. cit. 22: 110. 1906; 台湾植物志 3: 291. 1977. — *G. lanceolata* Hayata, Ic. Pl. Formos. 9: 30. 1920. — *G. elliptifoliola* Merr. in Lingnan Sci. Journ. 14: 12, f. 4. 1935; Chun in Sunyatsenia 4: 217. 1940; 海南植物志, 2: 316. 1965; 中国高等植物图鉴, 2: 500, 图 2729. 1972. Syn. nov. — *G. tenuiflora* auct. non (Klein ex Willd.) Wight et Arn.: 中国主要植物图说·豆科, 675. 1955, pro. syn.

多年生草质藤本。茎圆柱形，初时被短柔毛，后渐变无毛。叶柄长 2—6 厘米；小叶纸质或薄纸质，椭圆形、长圆形或披针形，长 3—7 厘米，宽 2—5 厘米，顶生 1 片通常较大，先端钝，微凹或不凹，具小凸尖，基部稍圆，上面被微柔毛或几无毛，下面被短柔毛；侧脉 5—8 对，纤细，小脉网状，两面明显，小叶柄长约 2 毫米，被毛；小托叶钻状，长约 1 毫米。总状花序腋生，长 4—20 厘米，被疏短柔毛；小苞片披针形，长 1.5—2 毫米；花少数，常 1—4 朵生于总轴的节上；花萼两面被疏微毛，萼管长 2.5—3 毫米，裂片狭披针形，长约等于萼管的 3 倍；花冠粉红色或淡紫色，长 8—11 毫米，微伸出萼外，各瓣具短瓣柄，旗瓣倒卵形或倒卵状椭圆形，基部狭，略具小耳；翼瓣与龙骨瓣长圆形或翼瓣呈椭圆形，近等长，先端钝，基部具短尖耳；雄蕊内藏，花药阔圆形，长约 1 毫米；子房狭长圆形，扁平，几无柄，密被白色长柔毛，花柱短，微弯，柱头小。荚果镰状长圆形，长 5—6.5 厘米，扁平，幼时被短柔毛；种子 6—8 颗，肾形，深褐色，略扁。 花期 7—9 月，果期 11—12 月。

产台湾和海南。生于海边旷地灌丛或低海拔丘陵地带疏林或密林中，常攀援于灌木或乔木上。模式标本采自台湾。

Merrill 发表产海南的 *G. elliptifoliola* Merr. 时，仅在描述后面提到与台湾产的 *G. formosana* Matsumura 有明显区别，但未具体指出两者不同之点。经过反复观察和比较，我们认为，无论从习性、叶形、花果等特征看，二者无明显不同，故予以归并。