

翼瓣长方形，长6毫米，基部二侧具线形附属体，瓣柄长3毫米；龙骨瓣镰形，长1厘米，顶端钝，瓣柄长8毫米；子房线形，被黄色粗毛，侧扁，花柱线形，长1厘米，无毛，柱头稍下处有一簇疏长毛。荚果线形，长5—6厘米，密被棕色粗毛。果期12月。

产我国台湾（高雄）。生于旱瘠的荒地。模式标本采自台湾高雄。

4. 海南镰扁豆（新拟） 越南扁豆（海南植物志） 图版67

Dolichos thorelii Gagnep. in Lecomte Not. Syst. 3: 191. 1914. et in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 2: 245. 1916; Chun et How in Acta Phytotax. Sin. 7: 26. 1958; 海南植物志 2: 328. 1965.

缠绕藤本。枝有棱和槽，被短柔毛。羽状复叶具3小叶；托叶卵状针形，具脉纹；小托叶线形，长3—5毫米；小叶卵状菱形，长6—7厘米，宽4—6厘米，先端渐尖而具小芒尖，基部圆或宽楔形，两面被伏贴的柔毛，基出脉3条。总状花序腋生，长7—14厘米，密被短柔毛，仅于顶端2—3厘米处有花；总花梗长5—11厘米；苞片卵形，具脉纹，早落；小苞片卵形，与萼近等长；花萼长约5毫米，裂齿极短，上部的2枚几全部合生；花冠白色而有紫色条纹，长16—18毫米，旗瓣内面中部以下有2枚长附属体，翼瓣倒卵状长椭圆形，瓣柄以上有1枚圆形的耳，龙骨瓣镰刀状，顶端钝，稍弯曲；子房线形，略被柔毛，花柱无毛，柱头画笔状。荚果线形，扁平，长6厘米，宽7毫米，被短柔毛，有种子7颗。花期12月。


产海南。生于旷野灌丛中或疏林下。越南亦有分布。

5. 滇南镰扁豆（新拟）

Dolichos junghuhnianus Benth. in Miq. Pl. Jungh. 240. 1852; Verdc. in Kew Bull. 24: 439. 1970. — *D. henryi* Harms in Fedde, Repert. Sp. Nov. 13: 137. 1921.

缠绕草本。茎密被疏长毛或近无毛。羽状复叶具3小叶；托叶宽披针形，小托叶线状披针形；小叶宽菱状卵形或卵形，长10—11厘米，宽9—9.5厘米，先端急尖或稍钝，或为极短的渐尖头，基部圆形或钝至宽楔形或微缺，被疏长毛；叶柄及叶轴均被疏长毛；小叶柄长4毫米。总状花序被短柔毛；花紫色，常成对生于花序轴肿胀的节上；花梗长4—7毫米；小苞片与萼片近等长，花萼长7—8毫米，齿短，上方的2裂齿几完全合生；花冠无毛；旗瓣近圆形，长约15毫米，中部以下具2瘤状体，基部具内折的耳，瓣柄弯曲；翼瓣斜长圆形，长16—17毫米；龙骨瓣脊部弯曲，钝；对旗瓣的一枚雄蕊离生；子房线形，具短柄，被极短的茸毛；花柱无毛，粗厚，柱头顶生，画笔状。荚果嫩时被绒毛，老时变无毛。

产云南南部。泰国、印度尼西亚亦有分布。模式标本采自云南红河（元江）勐板。



图版 67 海南镰扁豆 *Dolichos throelii* Gagnep.: 1. 花枝, 2. 旗瓣, 3. 翼瓣, 4. 龙骨瓣, 5. 雄蕊, 6. 雌蕊, 7. 荚果。(邓晶发绘)