

产我国台湾。

*P. heterophyllus* Hayata (1920) 是 *P. heterophyllus* Willd. (1809) 的后出异物同名, 不合法, 故改命上述新名。

#### 10c. 细叶小豇豆 (台湾植物志)

f. *linearis* (Hosokawa) Huang et Ohashi 台湾植物志 3: 413. 1977. — *Phaseolus minimus* Roxb. f. *linearis* Hosokawa in Journ. Soc. Trop. Agr. 5: 289. 1933.

小叶线形或线状披针形, 长 5—6 厘米, 宽 5—7 毫米, 先端钝或浑圆。

产我国台湾。生于海滨草丛。

#### 11. 琉球豇豆 (新拟)

*Vigna riukiensis* (Ohwi) Ohwi et Ohashi in Journ. Jap. Bot. 44: 31. 1969; Verdc. in Kew Bull. 24: 560. 1970. — *Phaseolus riukiensis* Ohwi in Journ. Jap. Bot. 13: 437. 1937. — *Azuki riukiensis* (Ohwi) Ohwi, Fl. Jap. 691. 1953. et in Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo 33: 77. 1953.

茎缠绕, 被反卷硬糙毛。羽状复叶具 3 小叶, 托叶卵形, 长 4—6 毫米, 盾状着生, 上面疏被硬糙毛, 具 5—7 脉; 顶生的小叶倒卵形或椭圆形, 长 2—4 厘米, 宽 1.2—2 厘米, 近纸质, 被稀疏的糙伏毛, 先端稍钝, 具短凸尖头, 基部楔形或极钝, 边全缘, 叶脉在背面凸起, 侧生小叶近等大, 斜卵形。总状花序具 5—8 花, 长 1—2 厘米; 总花梗长 3—10 厘米; 花萼倒锥形, 长 2.5 毫米, 除齿被缘毛外, 余无毛, 齿钝三角形, 近相等; 花冠黄色, 旗瓣凹圆形, 宽 1.2 厘米, 内面中部以下具四方形的瘤状体, 耳状体折叠内弯, 翼瓣倒卵形, 长 1 厘米, 瓣片基部具明显反折的附属体, 龙骨瓣拳卷, 中部以下一侧有角; 雄蕊二体, 花丝自中部连合; 子房线形, 疏被糙长毛, 花柱上部一侧具缘毛, 柱头上具小尖头。荚果近压扁, 长 3.5—4.5 厘米, 宽 4 毫米, 无毛, 棕色, 具细白色条纹; 种子椭圆形, 暗红色, 长 3 毫米, 种脐白色, 长 2 毫米。

产我国台湾。琉球群岛也有分布。

编者未见本种标本, 以上描述系据原记载改写。

#### 12. 赤豆 (唐本草) 小豆 (通称), 红豆 (广州), 红小豆 (东北)

*Vigna angularis* (Willd.) Ohwi et Ohashi in Journ. Jap. Bot. 44: 29. 1969; Verdc. in Kew Bull. 24: 557. 1970. — *Dolichos angularis* Willd. Sp. Pl. 3: 1051. 1800. — *Phaseolus angularis* W. F. Wight in U. S. Dept. Agr. Bur. Pl. Ind. Bull. 137: 17. 1909; How in Acta Phytotax. Sin. 3: 78. 1954; 中国主要植物图说·豆科 717. 图 696. 1955; 海南植物志 2: 324. 1965; 东北草本植物志 5: 169. 1976. — *Azuki angularis* (Willd.) Ohwi, Fl. Jap. 691. 1953., et in Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo 33: 77. 1953.

一年生、直立或缠绕草本。高 30—90 厘米, 植株被疏长毛。羽状复叶具 3 小叶; 托