

- 2.一年生枝除嫩梢外,无毛至几无毛;小枝表皮薄纸质,长条状纵裂;花长达2.4厘米;子房密被白色柔毛..... 1.尼泊尔鱼鳔槐 *C. nepalensis* Sims
- 2.一年生枝被伏贴细小柔毛,小枝表皮不开裂;花长1.8厘米以下,子房疏被短柔毛。
- 3.花鲜黄色,翼瓣瓣片近基部最宽,上部渐狭,与耳相对一侧不具齿缺;龙骨瓣的耳三角状半圆形,瓣柄与其成锐角相交..... 2.鱼鳔槐 *C. arborescens* Linn.
- 3.花红褐色至橙黄色,翼瓣瓣片上下几等宽,与耳相对一侧具1—2小齿缺;龙骨瓣的耳长圆形,瓣柄与其近平行..... 3.杂种鱼鳔槐 *C. × media* Willd.
- 1.小叶19—25片,总状花序具花8—14(—31)朵..... 4.膀胱豆 *C. delavayi* Franch.

1. 尼泊尔鱼鳔槐(新拟) 图版1: 1—7

Colutea nepalensis Sims in Curtis's Bot. Mag. 53: pl. 2627. 1826; Lindl. Bot. Reg. 20: pl. 1727. 1835; Browicz, Monogr. Bot. 14: 108. 1963; Ali in Nasir et Ali, Fl. W. Pakist. 100: 92. 1977; Ohashi, Enum. Fl. Pl. Nepal 113. 1979; 西藏植物志2: 777. 图247. 1985. ——*C. arborescens* Linn. var. *nepalensis* (Sims) Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 103. 1876; Brandis, Ind. Trees 217. 1906.


落叶灌木,高1—3米;老枝红褐色至褐色,无毛,有光泽,一年生枝白色至绿白色,有时枝皮条片状纵裂。羽状复叶有7—13片小叶,在新枝基部常簇生,长4—10厘米;叶轴疏被毛;托叶三角形;小叶常对生,椭圆形至倒卵形,长6—16毫米,宽7—11毫米,先端圆至近截平,具不明显小尖头,两面疏被毛或上面无毛,侧脉不明显;小叶柄长约1毫米。总状花序与叶近等长,生3—10花,总花梗长8—10厘米,被毛;苞片卵状披针形,与小苞片均被毛;花长达2.4厘米;花萼外面被毛,上边2萼齿短三角形,下边3萼齿线形,稍弯曲;花冠黄色,旗瓣外折,瓣片长20—22毫米,宽约19毫米,胼胝体长圆形,先端圆而外缘分离,瓣柄长5—6毫米,翼瓣瓣片长15毫米,瓣柄长约6毫米,瓣柄的上部一侧具长3毫米、宽1.5毫米、先端边缘有不规则缺刻的耳,龙骨瓣全部合生,瓣片近半圆形,长10—11毫米,宽7—8毫米,先端具喙,瓣柄长9—10毫米;子房扁平,长圆状披针形,密被白色柔毛,柄长3.5毫米,花柱长10毫米,弯曲,先端钩曲,近轴面(腹面)具纵列须毛,柱头小,顶生。荚果长圆形,长4—5.5厘米,宽2—2.5厘米,沿腹缝线具凹沟,先端尖至圆,基部具弯曲的果颈,被白色伏毛,果瓣薄革质;种子光滑。 花果期6—7月。

产西藏阿里地区和青海海西。生于海拔3000—3500米的山坡、河边石砾地灌丛中。印度、巴基斯坦、阿富汗也有。

2. 鱼鳔槐(中国树木分类学补编) 图版1: 8—15

Colutea arborescens Linn. Sp. Pl. 723. 1753; DC. Prodr. 2: 270. 1825; Ledeb. Fl. Ross. 1: 574. 1842; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 103. 1879; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 2: 87. 1907; Rehd. Man. Cult. Trees Shrubs 512. 1940; 中国主要植物图说·豆科 312. 图309. 1955; 东北植物检索表 181. 1959.

落叶灌木,高1—4米,小枝幼时被细小白色伏毛;羽状复叶有7—13片小叶,长6—



1—7.尼泊尔鱼鳔槐 *Colutea nepalensis* Sims: 1.果枝,2.花萼(展开),3.旗瓣,4.翼瓣,5.龙骨瓣,6.雄蕊,7.雌蕊。8—15.鱼鳔槐 *C. arborescens* Linn.: 8.花枝,9.花萼,10.果实,11.旗瓣,12.翼瓣,13.龙骨瓣,14.雄蕊,15.雌蕊。(葛克俭绘)