

产甘肃南部、青海东部、四川西部、西藏、云南。生于海拔2750—3000米山坡草地、林缘、灌丛、河岸、沙丘。模式标本采自四川。

系4. 刺叶系——Ser. Occidentales Kom. in Acta Hort. Petrop. 29: 309. 1909, ——  
Ser. *Acanthophyllae* Pojark. in Kom. Fl. USSR 11: 360. 1945.

小叶(3)4—5对, 羽状, 叶轴在长枝者硬化宿存, 短枝者脱落。萼筒钟状, 具短齿; 翼瓣稍长于龙骨瓣, 瓣柄长为瓣片的1/3, 耳长为瓣柄长的1/4—1/3, 花小型。荚果常细长。

系模式种: 刺叶锦鸡儿 *C. acanthophylla* Kom.

我国有4种, 1变种。

### 9. 弯枝锦鸡儿(植物分类学报)

**Caragana arcuata** Liou f. in Acta Phytotax. Sinica 22: 210. f. 1(3a—3f). 1984.

灌木, 高约80厘米。老枝褐色; 一年生枝黄褐色, 有棱; 短枝弯曲。羽状复叶有3—5对小叶; 托叶在长枝者硬化成针刺, 长1—3毫米, 短枝者基部残留, 密集, 针刺脱落; 叶轴嫩时被短柔毛, 长枝者硬化成针刺, 长1.5—2厘米, 短枝者脱落; 小叶倒卵状长圆形或倒卵形, 长6—9毫米, 宽2—4毫米, 先端圆钝, 有刺尖, 基部楔形, 两面疏被伏柔毛。花梗单生, 长3—5毫米, 被伏柔毛, 关节在基部; 萼钟状管形, 长7—8毫米, 外面被短伏柔毛, 齿缘具白色毛; 花冠黄色, 旗瓣长18—19毫米, 宽卵形或近圆形, 先端圆形或稍凹, 瓣柄长约为瓣片的1/3, 翼瓣近长圆形, 瓣柄长约为瓣片的1/2, 耳圆钝, 龙骨瓣的瓣柄稍短于瓣片; 子房无毛。花期5月。

产新疆(巩留)。生于海拔920米的山坡阳处。模式标本采自巩留莫合区可不基盖渡口。

### 10. 刺叶锦鸡儿(中国主要植物图说·豆科) 图版9: 20—25

**Caragana acanthophylla** Kom. in Acta Hort. Petrop. 29: 311. t. 14(B). 1909; Pojark. in Kom. Fl. USSR 11: 361. t. 24(5). 1945; 中国主要植物图说·豆科 344. 图 337. 1955; Golosk. in Pavl. Фл. Казахст. 5: 83. 1961; R. M. Vinogradova in Consp. Fl. As. Mediae 6: 61. 1981; 中国沙漠植物志 2: 220. 图 78(8—14). 1987.

灌木, 高0.7—1.5厘米, 由基部多分枝。老枝深灰色, 一年生枝浅褐色, 嫩枝有条棱, 被伏贴短柔毛。羽状复叶有(2)3—4(5)对小叶; 托叶在长枝者硬化成针刺, 长2—5毫米, 宿存, 短枝者脱落; 叶轴在长枝者硬化成针刺, 长1.5—4厘米, 宿存, 粗壮, 短枝者纤细, 脱落; 小叶倒卵形、狭倒卵形或长圆形, 长4—12毫米, 宽3—5毫米, 先端钝, 有刺尖, 基部稍狭, 两面近无毛或疏被短伏贴柔毛。花梗单生, 长1—2.5厘米, 中上部具关节, 苞片早落; 花萼钟状管形, 长6—10毫米, 近无毛; 花冠黄色, 长26—30毫米, 旗瓣宽卵形, 翼瓣长圆形, 瓣柄长约为瓣片的1/3—1/2, 耳齿状, 龙骨瓣的瓣柄长约为瓣片的3/4, 耳短小, 子房