

刺;叶轴常脱落,无毛;小叶椭圆形,长圆形或倒卵状椭圆形,长5—18毫米,宽4—12毫米,先端圆或稍凹,具刺尖,基部宽楔形或稍圆,幼时两面或仅下面沿脉上被绢毛,后期表面无毛,暗绿色,下面灰白色。花梗单生或2个并生,有时3个簇生,长15—28毫米,中部以上或近顶部具关节;花萼钟状,长6—11毫米,宽5—6毫米,无毛或疏被短柔毛,萼齿三角形;花冠黄色,长20—25毫米,旗瓣宽卵形,瓣柄为瓣片的1/2或较短,翼瓣的瓣柄与瓣片近等长,耳长约为瓣柄的1/3,龙骨瓣的瓣片与瓣柄近等长;子房被毛。荚果扁,长3—4厘米,宽4—5毫米,无毛。花期5月,果期7—8月。

产陕西南部、四川。生于山坡杂木林、山谷和河岸。模式标本采自四川。

33. 东北锦鸡儿(新拟) 骨担草(中国主要植物图说·豆科)

Caragana manshurica Kom. in Acta Hort. Petrop. 29: 336. t. 16(A). 1909; 中国主要植物图说·豆科 347. 图 341. 1955.

灌木,高1—2米;老枝褐色或灰褐色,有光泽或无,嫩枝稍被短柔毛。羽状复叶有5—10对小叶;托叶硬化成针刺,长4—12毫米,宿存或脱落;叶轴细瘦,长4—9厘米,脱落,稍被柔毛;小叶薄膜质,倒卵状椭圆形或长圆形,长1—2厘米,宽6—10毫米,先端圆钝、截平或凹入,具刺尖,基部宽楔形或圆形,疏被柔毛或无毛。花梗常单生,很少2个并生,长1—3厘米,被短柔毛,上部具关节,苞片刚毛状或不存在;花萼管状宽钟形,长8—9毫米,宽大于长或近相等,萼齿不明显,有缘毛;花冠黄色,长约23毫米,旗瓣近圆形,瓣柄长为瓣片的1/3,翼瓣先端稍尖,瓣柄长为瓣片的1/2,耳长齿状,长约2.5毫米,龙骨瓣的瓣柄较瓣片稍长,瓣片略呈楔形;子房近无毛。荚果膨胀或圆筒状,稍扁,长约5.5厘米,宽约5毫米,先端短渐尖,无毛。花期5月,果期7—8月。

产东北及华北。生于干山坡及林缘。模式标本采自东北。

本种与极东锦鸡儿 *C. fruticosa* (Pall.) Bess. 的区别在于花梗较长,翼瓣基部近楔形,小叶7—10对。与树锦鸡儿 *C. arborescens* (Amm.) Lam. 的区别在于花梗常单生,小叶7—10对,翼瓣基部楔形。与北京锦鸡儿 *C. pekinensis* Kom. 的区别在于子房近无毛,萼筒宽大,宽与长近相等或较大。

34. 新疆锦鸡儿(中国主要植物图说·豆科) 图版 11:21

Caragana turkestanica Kom. in Acta Hort. Petrop. 29:314. t. 14(C). 1909; Pojark. in Kom. Fl. USSR 11:364. 1945; 中国主要植物图说·豆科 350. 图 344. 1955; R. M. Vinogradova in Conspect. Fl. As. Mediae 6:62. 1981; 中国沙漠植物志 2:228. 1987.

灌木,高1—2米,多分枝。老枝灰色或灰绿色;小枝细长,无毛或嫩时被伏贴柔毛,淡褐色或绿褐色。羽状复叶有3—5对小叶;托叶脱落或宿存,硬化,长2.5—10毫米,水平开展;叶轴长3—6厘米,先端具刺尖,少数叶轴宿存,针刺细瘦或粗壮;小叶羽状,宽倒卵形或椭圆形,长1—2厘米,宽5—10毫米,先端圆形或截形,具刺尖,基部楔形,极少圆形,绿