

系11.灌木系——Ser. Frutescentes Pojark. in Kom. Fl. USSR 11: 332. 1945.

小叶密集叶轴顶部,假掌状,短枝上叶轴脱落,长枝上叶轴硬化成针刺,长4—10毫米。萼筒状或管状钟状,基部稍扩大。翼瓣和龙骨瓣的瓣柄与瓣片近相等,耳短。

系模式种:黄刺条 *C. frutex* (Linn.) C. Koch

我国有9种,2变种。

53. **红花锦鸡儿**(中国主要植物图说·豆科) 金雀儿(北京植物志),黄枝条(内蒙古植物志),乌兰-哈日嘎纳(蒙)

Caragana rosea Turcz. ex Maxim. in Prim. Fl. Amur. 470. 1859; Kom. in Acta Hort. Petrop. 29: 205. t. 5(C). 1909;东北木本植物图志 352. 1955;中国主要植物图说·豆科 321. 图 313. 1955;中国高等植物图鉴 2: 403. 图 2536. 1972;内蒙古植物志 3: 164. 图 83(1—9). 1977;秦岭植物志 1(3): 42. 1981. ——*C. wenhsiensis* C. W. Chang in Acta Phytotax. Sinica 17: 85. 3(1—9). 1979;秦岭植物志 1(3): 43. 图 31(1—9). 1981. ——*C. wenhsienensis* C. W. Chang var. *inermis* C. W. Chang, op. cit. 85;秦岭植物志 1(3): 44. 1981.

53a. **红花锦鸡儿**(原变种) 图版 4: 22—29

var. *rosea*

灌木,高0.4—1米。树皮绿褐色或灰褐色,小枝细长,具条棱,托叶在长枝者成细针刺,长3—4毫米,短枝者脱落;叶柄长5—10毫米,脱落或宿存成针刺;叶假掌状;小叶4,楔状倒卵形,长1—2.5厘米,宽4—12毫米,先端圆钝或微凹,具刺尖,基部楔形,近革质,上面深绿色,下面淡绿色,无毛,有时小叶边缘、小叶柄、小叶下面沿脉被疏柔毛。花梗单生,长8—18毫米,关节在中部以上,无毛;花萼管状,不扩大或仅下部稍扩大,长7—9毫米,宽约4毫米,常紫红色,萼齿三角形,渐尖,内侧密被短柔毛;花冠黄色,常紫红色或全部淡红色,凋时变为红色,长20—22毫米,旗瓣长圆状倒卵形,先端凹入,基部渐狭成宽瓣柄,翼瓣长圆状线形,瓣柄较瓣片稍短,耳短齿状,龙骨瓣的瓣柄与瓣片近等长,耳不明显;子房无毛。荚果圆筒形,长3—6厘米,具渐尖头。花期4—6月,果期6—7月。

产东北、华北、华东及河南、甘肃南部。生于山坡及沟谷。模式标本采自中国。

53b. **长爪红花锦鸡儿**(新变种)

var. *longiunguiculata* (C. W. Chang) Liou f., stat. nov. ——*C. longiunguiculata* C. W. Chang in Acta Phytotax. Sinica 17: 83. 1979;秦岭植物志 1(3): 44. 图 32(1—9). 1981.

与原变种的区别在于花较大,花冠长25毫米,花梗关节在中部以下。生于海拔800余米的山坡岩石缝中。模式标本采自陕西山阳县。

54. **北疆锦鸡儿**(新拟) 库车锦鸡儿(中国主要植物图说·豆科) 图版 18: 8—14