

Павл. Фл. Казахст, 5: 336, 1961. — *O. goloskokovii* Bajt. op. cit. 5: 493, 334, 1961.

多年生草本。主根淡褐色，细，深达 20 厘米，侧根少。茎直立，高 8—20 厘米，细弱，无毛或疏被贴伏白色柔毛，绿色。羽状复叶长 3—7 厘米；叶柄与叶轴上面有沟，疏被贴伏白色柔毛；托叶披针状卵形，长约 5 毫米，彼此于中部合生，分离部分披针状长圆形，先端尖，基部卵形，被贴伏白色柔毛；小叶 17 (21) —31，广椭圆形或长圆状卵形，长 5—12 毫米，宽 2—3 毫米，先端尖，基部圆形，两面疏被贴伏白色短柔毛。多花组成短总状花序；总花梗与叶等长，疏被贴伏柔毛；苞片线状披针形，长约 2 毫米；花长 8—11 毫米；花萼钟状，长 4—5 (—6) 毫米，被贴伏黑色和白色柔毛，萼齿披针状锥形，长 1—2 毫米；花冠紫色或蓝紫色，旗瓣 8—10 (—11) 毫米，瓣片圆形，宽 6—7 毫米，先端微缺，翼瓣与旗瓣近等长，先端微缺，龙骨瓣长约 8 毫米，喙长约 0.5 毫米。荚果硬膜质，长圆状广椭圆形，膨胀，长 10—15 毫米，宽 3—4 毫米，喙长 1—2 毫米，腹缝具深沟，被贴伏黑色和白色短柔毛，几无隔膜。1 室；果梗长 2—3 毫米。种子圆肾形，长约 1 毫米，褐色。 花果期 7—9 月。

产新疆西部。生于海拔 1 000—3 600 米的河谷、湿地、草地、河滩、盐渍草甸和高山草甸上。模式标本采自西帕米尔。中亚（准噶尔阿拉套、天山、帕米尔—阿赖）也有分布。

26. 盐生棘豆 (新拟)

Oxytropis salina Vass. in Notul. Syst. Herb. Inst. Bot. Kom. Acad. Sci. URSS 20: 234, 1960; I. Vass. et B. Fedtsch. in Kom. Fl. URSS 13: 50, 1948. descr. ross.

多年生草本，密丛生，绿色。茎缩短，分枝极多，细弱，长 5—10 厘米，被疏柔毛。羽状复叶长 2—(4) 5 厘米；托叶草质，离生，披针形，被短硬毛；叶柄与叶轴被贴伏疏柔毛或近无毛；小叶 15 (—17) —25 (—27)，椭圆形或披针形，长 3—6 毫米，宽 1—2 毫米，先端尖，基部圆形，两面被贴伏疏柔毛。5—7 花组成宽椭圆形或近头形总状花序，花排列较疏；总花梗细，长 3—7 厘米，较叶长，或与之等长；苞片线状披针形，与花梗等长，被疏柔毛；花长约 7 毫米；花萼钟状，长 3—4 毫米，被贴伏白色和黑色疏柔毛，萼齿线状披针形，稍短于萼筒；花冠蓝紫色，旗瓣长 6—7 毫米，瓣片圆形，先端微缺，翼瓣短于旗瓣，龙骨瓣与翼瓣等长，喙长 0.3—0.5 毫米。荚果近膜质，椭圆形，长 (8) 10—12 毫米，宽 3—4 毫米，喙长 2 毫米，被贴伏短黑色疏柔毛；果梗长 1—1.5 毫米。 花果期 7—8 月。

产内蒙古。生于草甸盐土上。模式标本采自俄罗斯乌兰乌德地区。俄罗斯东西伯利亚也有分布。

27. 砾石棘豆 (新疆植物检索表)

Oxytropis glareosa Vass. in Notul. Syst. Herb. Inst. Bot. Kom. Acad. Sci. URSS 20: 232, 1960; I. Vass. et B. Fedtsch. in Kom. Fl. URSS 13: 49, 1948; Bajt. in Pavl. Фл. Казахст, 5: 336, 1961.