

毫米，密被开展白色柔毛，不完全2室；果梗长1—2毫米。花期6—7月，果期7—8月。

产新疆天山南坡等地。生于高山带石质山坡。模式标本采自土耳其斯坦山区。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦也有分布。

112. 小丛生棘豆(新拟) 丛生棘豆(新疆植物检索表) 图版 29: 1—4

*Oxytropis caespitosula* Gontsch. ex Vass. et B. Fedtsch. in Kom. Fl. URSS 13: 551. tab. 7. f. 3. 1948; Bajt. in Pavl. Фл. Казахст. 5: 391. 1961.

多年生草本，高8—12厘米。根粗壮。茎缩短，丛生，灰白色。羽状复叶长5—8厘米；叶柄与叶轴细，疏被白色柔毛；托叶狭披针形，于中部与叶柄贴生，被黑色和白色柔毛；小叶11—17，长圆形、披针形，长3—6毫米，宽1—2毫米，两面被贴伏白色柔毛。多花组成头形总状花序；总花梗细，长于叶，或与之等长，被开展白色和黑色柔毛；苞片披针形，长为萼筒之半；花长13毫米；花萼筒状钟形，长7—8毫米，被白色和黑色绵毛，萼齿锥形，与萼筒等长；花冠蓝紫色，旗瓣长11—13毫米，瓣片圆状菱形，翼瓣长圆形，略短于旗瓣，龙骨瓣略短于旗瓣，喙长1毫米。荚果长圆形，长12—15毫米，宽4—5毫米，被白色长柔毛和黑色短柔毛，果梗长0.5—1毫米。花期7—8月，果期8—9月。

产新疆阿克苏和拜城等山区。生于高山带石质山坡。模式标本采自中亚阿拉套塔拉斯。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦也有分布。

组 6. 泡果棘豆组 Sect. *Physocarpon* Gontsch. in Kom. Fl. URSS 13: 542 (Addenda 13). 168. 1948.

茎缩短或近缩短，密被短柔毛，灰白色或淡灰白色。托叶于基部或下部与叶柄贴生，彼此分离或部分合生，小叶11—31 (—33)。花中等大，花萼长5—10毫米，花冠长8—15 (—18) 毫米，龙骨瓣喙短或长，或完全无。荚果膜质，球状卵形，泡状膨大，腹缝深凹，被开展疏柔毛，隔膜窄。

组名模式：微钝棘豆 *Oxytropis submutica* Bunge

本组有9种，分布于吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦和我国。中国有1种，1变种。

113. 长白棘豆 (东北植物检索表) 老鹳草、毛棘豆 (长白山)

*Oxytropis anertii* Nakai ex Kitag. in Rep. First Sci. Exped. Manch. sect. 4(2): 125. f. 17. 1935; id. Lineam. Fl. Mansh. 291. 1939; 东北草本植物志 5: 112. 图版 49. 图 10—18. 1976.

113a. 长白棘豆 (原变种) 图版 29: 9—18

var. *anertii*

多年生草本，高5—25厘米。根圆锥状、圆柱状，侧根少，直伸。茎极缩短，丛生。羽状复叶长4—12厘米；托叶膜质，卵状披针形，长约15毫米，于3/4处于叶柄贴生，