

毫米，直径3—4毫米，被长柔毛；种子三角状肾形，直径约1.8毫米，具凹点。花期4月，果期5—6月。

产东北、华北、华东、陕西中南部、甘肃东部等地区。一般生于海拔1300米以下的山坡、路旁、田边等。俄罗斯中、东西伯利亚和朝鲜北部亦有分布。模式标本采自北京西山。

本亚种在我国东北、华北全草做为紫花地丁入药。

2b2. 白花米口袋(变型)

f. *alba* (F. Z. Li) Tsui comb. nov. — *G. multiflora* f. *alba* F. Z. Li in Acta Phytotax. Sin. 22(2): 152, 1984.

花白色，余同米口袋原变型。

偶见于山东泰安及南京。

3. 长柄米口袋 (中国主要植物图说·豆科)

Gueldenstaedtia harmsii Ulbr. Bot. Jahrb. 36, Biebl. 82: 58, 1905; B. Fedtsch. in Nouv. Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 34: 1441, 1928; 中国高等植物图鉴 2: 415, 1972. — *G. multiflora* Bunge var. *longiscapa* Franch. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris sér. 2, 5: 244 1883. — *G. longiscapa* (Franch.) Lévl. Cat. Pl. Yun-Nan, 155, 1916. — *G. giraldi* var. *longiscapa* (Franch.) Jacot in Journ. N. China Roy. Asiat. Soc. 58: 112 1927. — *G. giraldii* Harms f. *elongata* Pavol. in Nouv. Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 15: 410, 1908. — *G. brachyptera* Pamp. var. *elongata* (Pavol.) Pamp. in Nouv. Giorn. Bot. Ital. ser. 2, 17: 396, 1910; B. Fedtsch. op. cit. 1440. — *G. brachyptera* Pamp. l. c.; Jacot, op. cit. 107; B. Fedtsch. l. c. — *Amblytropis harmsii* (Ulbr.) C. Y. Wu ex Tsui, 中国主要植物图说·豆科 369, 图 363, 1955.

多年生草本，主根直下，分茎极缩短，托叶卵形或狭三角形，先端渐尖，基部合生并贴生于叶柄，外面被稀疏白色长疏毛，内面无毛。叶通常长10—13厘米，小叶9—13片，卵形到椭圆形，通常长2—13毫米，宽1.5—7毫米，果时可长达15毫米，宽9毫米，成长卵形或长椭圆形，先端圆形、截形或凹下成弧形，具细尖，两面被稀疏白色长柔毛，有时上面近于无毛。伞形花序有8朵花，总花梗极长，长10—23厘米，约长于叶1/3到一倍；苞片狭三角形，小苞片线形；花梗约2—3毫米；萼钟状，长7毫米，绿色，被白色疏柔毛，具5不等萼齿，上面萼齿较宽大，狭三角形，长3.5毫米，宽2毫米，下3萼齿较短，狭于上2萼齿一半，最下1萼齿最短。花冠紫色，旗广卵形到近圆形，长12毫米，宽8.5毫米，先端微缺，基部渐狭成瓣柄，翼瓣长倒卵形具斜截头，长11毫米，最宽处3.5毫米，具耳，线形瓣柄长2毫米，龙骨瓣斜倒卵形，长5.5毫米，具耳，线形瓣柄长2.5毫米；子房圆棒状，密被长柔毛，花柱向上卷曲，先端膨大为柱头。荚果圆柱形，长17毫米，直径4毫米，被白色疏柔毛；种子肾形，具凹点。花期3月，果期5月。