

2—5 朵花；总花梗与叶等长或稍超出；苞片钻形；小苞片线形，贴生于萼筒。花萼钟状，上 2 萼齿最大而宽。下 3 萼齿较短狭；旗瓣卵形，长 13.5 毫米，宽 8 毫米，基部渐狭成瓣柄，翼瓣长倒卵形具斜截头，长 10 毫米，宽 2.5 毫米，具耳及线形短瓣柄，龙骨长卵形，长 7 毫米，宽 2 毫米，瓣柄长 2.5 毫米；子房长椭圆形，花柱先端内卷。荚果圆棒状。种子肾形。具凹点。花期 3 月，果期 5 月。

产辽宁、河北、山西、山东等省。生于山坡、草地、田边等处。模式标本采自山东烟台。

8. 甘肃米口袋(东北林学院植物研究室汇刊) 图版 40: 17—24

Gueldenstaedtia gansuensis Tsui in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 5: 44. 1979.

多年生草本，主根直下，分茎较缩短。托叶狭三角形，被稀疏柔毛，基部合生并贴生于叶柄，叶长 2—5 厘米，被疏柔毛，小叶 9—15 片，椭圆形或长圆形，长 2—8 毫米，宽 1.5—3.5 毫米，先端圆到微缺。伞形花序具 2—3 朵花，总花梗纤细，可长于叶一倍，被疏柔毛；苞片钻形，小苞片线形。花萼钟状，长 5 毫米，上 2 萼齿稍长而宽，长 2.5 毫米，下 3 萼几相等；花冠紫红色，旗瓣倒卵形，长 9 毫米，宽 5 毫米，基部渐狭成瓣柄，翼瓣长倒卵形具斜截头，长 7 毫米，宽 2 毫米，具短线形瓣柄，龙骨瓣卵形，长 4 毫米，宽 1.5 毫米，先端具斜急尖，具耳及线形瓣柄，瓣柄长 2 毫米，子房圆棒状，密被长柔毛，花柱纤细，卷曲。荚果狭长卵形，或圆棒状，长 1.5 厘米，宽 3.5 毫米，被稀疏柔毛；总果梗较叶长。种子肾形，具凹点。花期 3 月，果期 5 月。

分布于陕西、甘肃。模式标本采自甘肃庆阳。

9. 细瘦米口袋(东北林学院植物研究室汇刊) 图版 38: 1—8


Gueldenstaedtia gracilis Tsui in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 5: 45. 1979.

多年生草本，叶及花梗丛生于分茎端。叶长达 14 厘米，叶柄具沟，非常纤细；托叶长三角形，被贴伏长柔毛，小叶 13—15 片，长椭圆形，长 6—9 毫米，宽 2—3 毫米，顶端具明显细尖，两面被白色长柔毛，上面较稀疏。伞形花序有花 4—5 朵，花梗极纤细，具沟，花期稍超过叶长；花梗长 1.5 毫米；苞片及小苞片线形，花萼钟状，被长柔毛，长 5 毫米，上 2 萼齿较大，长 2.8 毫米；花冠紫色，旗瓣倒卵形，长 7.5 毫米，宽 4.5 毫米，先端渐尖，具不明显微缺，基部渐狭成瓣柄，翼瓣倒卵形具斜截头，长 6 毫米，最宽处宽 1.7 毫米，具弯曲的线形瓣柄，瓣柄长 1.8 毫米，具短耳，龙骨瓣较大，长 4.2 毫米，宽 1 毫米，斜倒卵形，线形瓣柄长 1.8 毫米，子房圆柱状，被贴伏白色柔毛，花柱先端卷曲。荚果圆柱状。先端渐尖，长 1.3 厘米，径 3 厘米，被稀疏白色柔毛。种子肾形，具凹点。花期 4 月，果期 11 月。

分布于云南南部。生于江边石滩阳处。模式标本采自云南景洪。

10. 狭叶米口袋(中国主要植物图说·豆科) 图版 40: 25—31

Gueldenstaedtia stenophylla Bunge in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang. 2: 98.



图版 38 1—8. 细瘦米口袋 *Gueldenstaedtia gracilis* Tsui: 1. 花枝; 2. 果枝; 3. 花萼 (展开); 4. 旗瓣; 5. 翼瓣; 6. 龙骨瓣; 7. 子房; 8. 种子。9—14. 川鄂米口袋 *Gueldenstaedtia henryi* Ulbr.: 9. 植株; 10. 花萼 (展开); 11. 旗瓣; 12. 翼瓣; 13. 龙骨瓣; 14. 子房。15—21. 川滇米口袋 *Gueldenstaedtia delavayi* Franch.: 15. 植株; 16. 较大的叶; 17. 花萼 (展开); 18. 旗瓣; 19. 翼瓣; 20. 龙骨瓣; 21. 子房。(张泰利绘)