

Ind. 2: 147, 1879.

多年生草本，茎缩短。奇数羽状复叶，簇生；托叶鳞片状，抱茎。总状花序腋生，苞片披针形，小苞片2枚；萼钟状，5裂，萼齿稍不等长；花冠深红色，旗瓣与龙骨瓣约等长，翼瓣较短；雄蕊为9+1的2体，花药同型；子房线形，具不多的胚珠，花柱丝状，上部曲折，柱头头状。果实具不明显的缢缩，边缘和侧面具皮刺。种子半圆形或近肾形。

单种属，为克什米尔、喜马拉雅和我国青藏高原的特有种。

藏豆 (西藏植物志) 图版 58: 10—17

Stracheya tibetica Benth. in Journ. Bot. Kew Misc. 5: 307, 1853; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 147, 1879; Ali in Nasir et Ali, Fl. W. Pakistan 100: 333, 1977. — *Astragalus toktjenensis* Ulbr. in Hedin, South. Tib. 6, 1922.


多年生草本，高3—5厘米。根纤细，具细长的根茎。茎短缩，不明显，被托叶所包围。叶长4—8厘米，仰卧；托叶卵形，棕褐色干膜质，长7—10厘米，几完全合生，被贴伏长柔毛；叶轴被长柔毛；小叶通常11—15，小叶片长卵形或椭圆形，长8—10毫米，宽3—5毫米，先端钝圆，基部楔形，两面被长柔毛，上面的毛常卷曲或有时近无毛。总状花序腋生，等于或短于叶，总花梗和花序轴被柔毛；花一般3—6朵，近伞房状排列；花长17—20毫米；苞片卵状披针形，长为花梗的1倍，外被贴伏柔毛；花梗1—2毫米长，被柔毛；花萼斜钟状，长约7—8毫米，萼齿披针形，等于或稍长于萼筒，5萼齿近等长或下萼稍狭而长；花冠玫瑰紫色或深红色，旗瓣倒长卵形，长约16—18毫米，先端圆形、微凹，基部楔形，翼瓣狭长圆形，上角向前突出，下角呈弯缺状，龙骨瓣与旗瓣近等长；子房线形，无毛。荚果两侧稍膨胀，被短柔毛，横脉隆起，边缘和沿两侧中线具1—1.5毫米长的皮刺，刺基扁平。花期7—8月，果期8—9月。

产西藏、青海(玉树地区)。生于高寒草原的沙质河滩、阶地、洪积扇冲沟和其他低凹湿润处。也分布于克什米尔和巴基斯坦北部山地。

105. 驴食草属 *Onobrychis* Mill.

Mill. Gard. Dict. Arb. ed. 4, 2, 1754.

一年生或多年生草本，有时为具刺的小灌木。叶为奇数羽状复叶；托叶干膜质，离生或合生；小叶全缘，无小托叶。总状花序腋生或有时花序呈穗状；苞片暗棕色，干膜质；具长的总花梗；小苞片2，钻状，着生萼筒基部或无苞片；花萼钟状，5齿裂，萼齿披针状线形，近等长或下萼齿较狭小，上萼齿之间的距离较宽大；花冠紫红、玫瑰紫色或淡黄色，旗瓣倒卵形或倒心形，翼瓣短小，龙骨瓣等于、长于或短于旗瓣；雄蕊为9+1的2体，分离的1枚雄蕊在中部与雄蕊管粘着，花药同型；子房无柄，1—2枚胚珠，花柱丝状，上部与雄蕊同时内弯，柱头头状，顶生，小。荚果通常1节，节荚半圆形或鸡冠状，两侧膨胀，不开裂，脉纹隆起，通常具皮刺。种子宽肾形或长圆形。2n=14, 16, 28, 32。



图版 58 1—8. 顿河红豆草 *Onobrychis taneitica* Spreng.: 1. 花枝; 2. 展开的花萼; 3. 旗瓣; 4. 翼瓣; 5. 龙骨瓣; 6. 雄蕊; 7. 雌蕊; 8. 荚果。9. 美丽红豆草 *Onobrychis pulchella* Schrenk.: 荚果。10—17. 藏豆 *Stracheya tibetica* Beath.: 10. 植株; 11. 展开的花萼; 12. 旗瓣; 13. 翼瓣; 14. 龙骨瓣; 15. 雄蕊; 16. 雌蕊; 17. 荚果。(傅季平绘)