

圆周 $1/3$ 。 花果期 5—8 月。

产西藏。生于海拔 2 000—4 300 米高山松林，次生林缘，山坡草地或灌丛。模式标本采自四川康定榆林口 (Yuling Kong)。

12. 精致野豌豆 (秦岭植物志)

Vicia perelegans K. T. Fu 秦岭植物志 1(3): 93. 图 73. 1981.

多年生草本，高 20—40 厘米。根部近木质化，须根发达。茎具棱，多分支，表皮具褐斑，植株被微柔毛。偶数羽状复叶长 2—6 厘米，顶端卷须有 2—3 分支，托叶二深裂，裂片披针形，长 0.25—3 厘米；小叶 5—8 对，近革质，狭长圆形或狭卵状长椭圆形，长 0.5—1.7 厘米，宽 0.3—0.5 厘米，先端平截或近圆形，具短尖头，基部圆形，侧脉 8—15 对，两面凸出，极精致，下面中脉被短柔毛，小叶柄仅长 1 毫米。总状花序与叶近等长，长 4—7 厘米，具花 7—10 朵，稀疏着生于花序轴上部，小花梗长 1—2 毫米，被毛；萼斜钟状，长约 4 毫米，外面被疏柔毛，萼齿三角状锥形，长 10—15 毫米；花冠紫色或蓝色，长 10—11 毫米，宽约 4 毫米，旗瓣长圆形或狭倒卵形，长约 1 厘米，宽 4 毫米，先端圆，微凹，中上部微缢缩，基部近圆形，翼瓣略短于旗瓣，龙骨瓣长于旗瓣，子房无毛，具细长柄；胚珠 4—5，花柱上部四周密被白柔毛。荚果长圆形，长约 2.5 厘米，宽约 0.7 厘米，两端急尖。种子 2—3，扁圆形，直径 3 毫米，表皮深棕黑色，种脐白色，长相当于种子圆周 $1/3$ 。 花期 4—5 月，果期 7—10 月。

产陕西、甘肃、四川等省。生于海拔 850—1 200 米坡地、山谷、草丛。模式标本采自陕西文县。

13. 黑龙江野豌豆 (东北草本植物志) 圆叶草藤 (东北)，大巢菜 (山西)

Vicia amurensis Oett. in Act. Hort. Bot. Univ. Jurjev. 6: 143. 1905; B. Fedtsch. in Kom. Fl. URSS 13: 445. 1948, 东北草本植物志 5: 138. 1976; 内蒙古植物志 ed. 2, 3: 372. 1989. — *Vicia japonica* A. Gray var. *pratensis* Kom. et var. *silvatica* Kom. Fl. Mansh. 2: 613. 1904. — *Vicia ussuriensis* Oett. (lapsu) in Kom. et Alis. Abr. Man. Hent. Ident. Far. East. Pl. 278. 1925. — *Vicia amurensis* Oett. var. *pratensi* (Kom.) Hara et var. *silvatica* (Kom.) Hara in Journ. Jap. Bot. 16: 258. 1940. — *Vicia pallida* var. *pratensis* (Kom.) Nakai in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 31: 469. 1911. — *V. japonica* auct. non A. Gray.: Grub. Consp. Fl. Mar. 196. 1955.

13a. 黑龙江野豌豆 (原变型)

f. *amurensis*

多年生草本，高 50—100 厘米，植株近无毛。根粗壮，木质化，直径可达 4 厘米。茎斜升攀援，具棱，偶数羽状复叶，长 5—15 厘米，近无柄；顶端卷须有 2—3 分支；托叶半箭头形，2 深裂，有 3—5 齿；小叶 3—6 对，椭圆形或长圆卵形，长 1.6—3 厘米，宽 0.9—1.6 厘米，先端微凹，基部宽楔形；全缘，微被柔毛，后渐脱落；侧脉较密与中脉联接，直达边缘波形相连。总状花序与叶近等长；花 15—30 朵密集着生于总花序轴上部，