

1/2。 花期4—6月，果期6—9月。

产华东、河南、湖南。生于海拔200—1200米山谷竹林、湿地及草丛或沙地。

全草药用，有清热解毒之效。国外报道其种子内含物可用于治疗帕金森式麻痹震颤症。

27. 弯折巢菜 (黄山植物研究) 羽叶野豌豆 (种子植物属种检索表)

Vicia deflexa Nakai in Bot. Mag. Tokyo 37: 12. 1923; 黄山植物研究, 135. 1965; 种子植物属种检索表, 上册 175. 1980.

多年生直立草本，高30—100厘米。茎具棱，呈对称弯折“之”字形上升。偶数羽状复叶，长3—7.5厘米，叶柄顶端无卷须，具短尖头；托叶三角形或披针形，长0.3—0.6厘米，宽0.1—0.3厘米；小叶3—4对，狭长圆形至长圆披针形，长3—6.5厘米，宽1.1—2厘米，先端渐尖，基部圆形，叶脉清晰，边缘微波状。总状花序长2—7厘米，与叶近等长；花萼近钟形，萼齿甚短，呈微波状；具花7—10朵，长1.5—2厘米，宽0.3—0.4厘米，小花梗长0.2厘米；花冠深红紫色至浅紫色，旗瓣长圆形，长约1.5厘米，宽约0.6厘米，先端圆，基部渐狭，翼瓣、龙骨瓣近等长；子房线形，长约0.6厘米，花柱上部四周被毛。荚果长圆状菱形，长2.5—4厘米，宽约0.6厘米，表皮革质，棕黄色具黑褐色斑。种子2—6，扁圆柱形，长0.5厘米，直径0.3厘米；表皮褐色，具黑斑；种脐长相当于种子圆周的1/2。 花果期6—10月。

产江苏、浙江、安徽、湖南、湖北等省。生于海拔200—1400米山谷、溪边及竹林中。日本亦有分布。

28. 千山野豌豆 (东北草本植物志) 图版 66: 9—10

Vicia chianshanensis (P. Y. Fu et Y. A. Chen) Xia in Acta Phytotax. Sin. 34(4): 433. 1996. — *V. ramuliflora* (Maxim.) Ohwi f. *chianshanensis* P. Y. Fu et Y. A. Chen in Fl. Herb. Chin. Bor.-Orient. 5: 177. 1976.

多年生草本，高40—60厘米，根茎短，有多数不定根，近木质化。茎直立，单一或少数分支，具棱，微被贴伏柔毛。偶数羽状复叶，长4—5厘米，具小叶2对，叶轴顶端具短尖头；托叶斜卵形，长12—15毫米，宽6—8毫米，膜质，全缘，下端具1尖齿；小叶宽椭圆形，纸质，长2—4厘米，宽1.8—2厘米，先端锐尖，具短尖头，基部宽楔形，侧脉8—10对，近叶缘处网状连接，叶脉在下面凸起，两面均清晰，无毛。总状花序单生叶腋，略长于叶，总花梗挺直，被细柔毛，花6—12朵密集着生于花序轴上部；花梗约4毫米，被毛；萼筒状，基部偏斜，长1—1.2厘米，萼齿丝状，旗瓣卵状长圆形，中部略缢缩；翼瓣与旗瓣等长；龙骨瓣稍短，具耳。子房线形，具子房柄，花柱细长，柱头棍棒状，四周被髯毛，胚珠5—6。果未见。 花果期5—7月。

产辽宁、山东。生于山坡杂木林中、坡地及路旁。模式标本采自辽宁鞍山市千山。

29. 柳叶野豌豆 (东北草本植物志) 脉叶野豌豆 (中国主植物图说·豆科)，脉基巢菜 (国产牧草植物)，细脉巢菜 (吉林)，脉草藤 (内蒙古)