

1.4 厘米；翼瓣等长，龙骨瓣较短。荚果斜长圆形，长 2.5—3 厘米，宽约 5 毫米，先端具短喙，无毛。表皮熟后暗棕色。 花果期 7—9 月。

产东北、西北。生于向阳山坡、灌丛、草地和林缘。朝鲜、日本、俄罗斯西伯利亚和远东也有分布。

组 4. 四籽野豌豆组 Sect. *Ervum*. (Linn.) S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614. 1821; Taub. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenf. 3, 3: 350. 1894.

小叶 (2) 3—5 (—18) 对，顶端具单一或分支卷须，小叶线形或狭披针形；托叶小，下面无腺点，花序少花仅 1—4 (—7) 朵，花柱圆柱形，微被柔毛。

组模式：四籽野豌豆 *Vicia tetrasperma* (L.) Schreber

33. 索伦野豌豆 (东北草本植物志)

Vicia geminiflora Trautv. in Act. Hort. Petrop 3: 42. 1875; B. Fedtsch. in Kom. Fl. URSS 13: 443, tab. 25, fig. 5. 1948; 东北草本植物志 5: 141. 1976.

多年生草本，高 25—50 厘米。根茎细，茎细柔，斜升，植株嫩时被毛，后渐脱落。偶数羽状复叶顶端卷须单一；托叶线披针形，小叶 2—5 对，线形，长 2.5—3 厘米，宽 0.2—0.3 厘米，先端平截或圆，具短尖头，基部披针形，叶脉不明显。总状花序长于叶，具花 2—3 (—4) 朵，聚集着生于长 7—8 厘米的花序轴顶端；萼钟状，萼齿三角形至线披针形；花冠蓝紫色或紫色，长 1.6—2.6 厘米，旗瓣倒卵长圆形，先端微凹，翼瓣短于旗瓣，龙骨瓣短于旗瓣；子房柄较长，花柱上部被黄白色绢毛，胚珠多数。 花期 6—7。

产东北、内蒙古。生于河岸草丛。俄罗斯西伯利亚地区亦有。

34. 多叶野豌豆 图版 62: 17—23

Vicia multijuga Xia in Acta Phytotax. Sin. 34(4): 424. 1996.

多年生草本，高 70—90 厘米。茎具棱，被疏柔毛。偶数羽状复叶长 7—11 厘米，叶轴末端有卷须；托叶戟形或近披针形，长 0.5—0.7 厘米，宽 0.1—0.5 厘米；小叶 9—11 对，狭披针形，长 1.5—2.7 厘米，宽 0.3—0.6 厘米，先端渐尖，具短尖头，基部斜圆形，两面及小叶柄被毛。总状花序短于叶，花 2—7 朵着生于花序轴上部；花萼近钟状，长约 0.6 厘米，外面被绒毛，萼齿锥形，长约 0.2 厘米；花冠紫色，旗瓣长圆形，长 1—1.2 厘米，宽约 0.5 厘米，先端钝圆微凹，瓣柄相当于旗瓣片 1/3，翼瓣与旗瓣近等长，龙骨瓣短于翼瓣；子房纺锤形，长约 0.5 厘米，胚珠 6，花柱圆形，与子房联接近呈 90° 夹角。子房柄长约 0.3 厘米。荚果未见。 花期 7 月。

产陕西渭南箭峪岭。生于 2500 米山顶草地。模式标本采自陕西渭南。

35. 四花野豌豆

Vicia tetrantha H. W. Kung in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 3: 391. 1935; 中国主要植物图说·豆科 618. 图 595. 1955; 秦岭植物志 1(3): 94. 1981.



图版 62 1—8. 长齿野豌豆 *Vicia longicuspis* Xia: 1. 花枝; 2. 花萼; 3. 旗瓣; 4. 翼瓣; 5. 龙骨瓣; 6. 雄蕊; 7. 子房; 8. 小叶。9—16. 二色野豌豆 *Vicia dichroantha* Diels: 9. 花枝; 10. 花萼; 11. 旗瓣; 12. 翼瓣; 13. 龙骨瓣; 14. 子房; 15—16. 小叶。17—23. 多叶野豌豆 *Vicia multijuga* Xia: 17. 花枝; 18. 花萼; 19. 旗瓣; 20. 翼瓣; 21. 龙骨瓣; 22. 子房; 23. 小叶。(蔡淑琴绘)