

多年生草本，长60—120厘米。茎纤细，具棱，无毛。偶数羽状复叶长5—9厘米，叶轴顶端卷须单1或分支；托叶披针形或椭圆形，长约0.3厘米；小叶8—10，狭长圆形，长1.2—1.4厘米，宽0.4—0.5厘米，先端钝，微凹，基部圆形，无毛。总状花序短于叶，通常具花4朵，密集于花序轴顶端；花梗被硬毛；苞片早落；花萼钟状，长约4.5毫米，萼齿三角形或近披针形，长约1.5毫米，最上面的2齿略短；花冠蓝紫色；旗瓣提琴形，长约1.1厘米，先端微凹，中部缢缩，基部宽楔形；翼瓣与旗瓣近等长，龙骨瓣略短于翼瓣；子房无毛，具柄，花柱上部四周被长柔毛。荚果长圆形，无毛，长约2.3厘米，宽约0.6厘米。种子1—5，圆球形，径约0.3厘米。花期8—9月。

产陕西、湖北等省。生于海拔1000米山坡、路旁。模式标本采自陕西秦岭南坡。

36. 大花野豌豆 (东北草本植物志) 山黧豆 (救荒本草)，三齿萼野豌豆 (中国主要植物图说·豆科、中国高等植物图鉴)，三齿野豌豆 (秦岭植物志、云南种子植物名录)，山豌豆 (河北)，三齿草藤 (甘肃)，老豆蔓、毛苕子 (陕西)，野豌豆 (陕西、山西、四川) 图版68: 1—10


*Vicia bungei* Ohwi in Journ. Jap. Bot. 12: 330. 1936; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 294. 1939; 中国主要植物图说·豆科 613. 图 589. 1955; 中国高等植物图鉴 2: 480. 图 2689. 1972; 中国东北草本植物志 5: 141. 图 62. 1976; 秦岭植物志 1(3): 97—98. 图 76. 1981; 云南种子植物名录 1: 635. 1984; 内蒙古植物志 3: 373—374. 1989. — *Vicia tridentata* Bunge in Mém. Acad. Sci. St. Petersb. Sav. Etrang. 2: 93. 1833, non Gaterau 1789; Kom. Fl. Mansh. 2: 616. 1904; H. W. Kung in Contr. Inst. Bot. Acad. Peip. 389. 1935.

一二年生缠绕或匍匐伏草本，高15—40(—50)厘米。茎有棱，多分枝，近无毛。偶数羽状复叶顶端卷须有分枝；托叶半箭头形，长0.3—0.7厘米，有锯齿；小叶3—5对，长圆形或狭倒卵长圆形，长1—2.5厘米，宽0.2—0.8厘米，先端平截微凹，稀齿状，上面叶脉不甚清晰，下面叶脉明显被疏柔毛。总状花序长于叶或与叶轴近等长；具花2—4(—5)朵，着生于花序轴顶端，长2—2.5厘米，萼钟形，被疏柔毛，萼齿披针形；花冠红紫色或金蓝紫色，旗瓣倒卵披针形，先端微缺，翼瓣短于旗瓣，长于龙骨瓣；子房柄细长，沿腹缝线被金色绢毛，花柱上部被长柔毛。荚果扁长圆形，长2.5—3.5厘米，宽约0.7厘米。种子2—8，球形，直径约0.3厘米。花期4—5月，果期6—7月。

产东北、华北、西北、山东、江苏、安徽及西南等地。生于海拔280—3800米山坡、谷地、草丛、田边及路旁。

37. 四籽野豌豆 (中国主要植物图说·豆科) 丝翘翘 (野菜博录、云南种子植物名录)，四籽草藤 (秦岭植物志)，苕子、野扁豆、野苕子 (陕西)，乔乔子、小乔菜 (浙江)

*Vicia tetrasperma* (Linn.) Schreber, Spicil. Fl. Lips. 26. 1771; Moench, Meth. Pl. Hort. Bot. Agr. Marbug. 148. 1794; H. W. Kung in Contr. Inst. Bot. Nat. Acad. Peip. 3(8): 389. 1935; 中国主要植物图说·豆科 613. 图 590. 1955; 中国高等植物图鉴 2: 480. 图 2690. 1972;



图版 68 1—10. 大花野豌豆 *Vicia bungei* Ohwi: 1. 花枝; 2. 花萼; 3. 旗瓣; 4. 翼瓣; 5. 龙骨瓣; 6. 子房; 7. 荚果; 8. 种子; 9—10. 小叶 (示叶形变化)。11—18. 多茎野豌豆 *Vicia multicaulis* Ledeb.: 11. 花枝; 12. 花萼; 13. 旗瓣; 14. 翼瓣; 15. 龙骨瓣; 16. 荚果; 17. 种子; 18. 小叶。19—27. 新疆野豌豆 *Vicia costata* Ledeb.: 19. 花枝; 20. 花萼; 21. 旗瓣; 22. 翼瓣; 23. 龙骨瓣; 24. 子房; 25. 荚果; 26. 种子; 27. 小叶。(蔡淑琴绘)