

可以做家畜饲料。

4. 中华山黧豆 图版 70: 9—17.

Lathyrus dielsianus Harms in Bot. Jahrb. 29: 417. 1901; Bässler in Fedde, Repert. Sp. Nov. 84: 427. 1973; Tsui in Bull. Bot. Res. 4(1): 42. 1984. — *L. wilsonii* Craib in Kew Bull. 27. 1914; Bässler op. cit. 428.

多年生草本，高 80—100 厘米，具纤细根状茎，直下或横走。茎圆柱状，具细沟纹，直立，无毛。托叶斜卵形，下缘常具齿，无毛；叶轴末端有具分枝的卷须；小叶 (2) 3—4 (—5) 对卵形到卵状披针形，稍不对称，长 3.5—4.5 (—6.5) 厘米，宽 1.3—2 (—3.3) 厘米，先端圆而微下凹，或渐尖而钝尖头，具细尖，基部楔形、宽楔形或有时圆，上面绿色，下面灰绿色，两面无毛，具羽状脉。总状花序腋生，有花 9—11 (—13) 朵；较叶短；萼钟状，无毛，长 7—8 毫米，萼齿短，最下 1 齿长 1.5—2 毫米，最上二齿针刺状；花粉红色或紫色，长 1.8—1.9 厘米；旗瓣长 (16) 18—19 毫米，宽 (6) 8—9 (—11) 毫米，瓣片扁圆形或近圆形，先端微凹，瓣柄长 11 毫米，翼瓣长倒卵形，先端圆形，长 7—8 毫米，宽约 3 毫米，具耳，线形瓣柄长 9—12 毫米，龙骨瓣瓣片长卵形，先端渐尖，长 7—8 毫米，宽约 3 毫米，具耳，线形瓣柄长 8 毫米；子房线形，无毛。荚果线形，长 5.5—8 厘米，宽 6—7 毫米，柄长 6—7 毫米，褐色。种子椭圆形，长 5 毫米，宽 4 毫米，种脐长 2 毫米，平滑。花期 5—6 月，果期 7—8 月。

产陕西南部、山西西南部及四川东部、南部、湖北西北部，生于水边、山坡、沟内等阴湿处或疏林下。模式标本采自四川南川。

5. 海滨山黧豆(东北植物检索表) 海滨香豌豆(中国主要植物图说·豆科)

Lathyrus japonicus Willd. Sp. Pl. 3: 1092. 1802; Fern. in Rhodora 34: 177. 1932; Kitagawa Lineam. Fl. Mansh. 187. 1939; P. W. Ball in Fedde, Repert. Sp. Nov. 79: 46. 1963. et in Tutin et al. Fl. Europ. 2: 138 1968. Ohwi, Fl. Japan new. ed. 802. 1978; Bässler in Fedde, Repert. Sp. Nov. 84: 405. 1973; Tsui in Bull. Bot. Res. 4(1): 44. 1984. — *L. maritimus* Bigelow, Fl. Boston, ed. 2. 268. 1824; Maxim. Prim. Fl. Amur. 82. 1859; Kom. Fl. Mansh. 2: 626. 1904; B. Fedtsch. in Kom. Fl. URSS 13: 507. 1948; 中国主要植物图说·豆科 631. 1955; Ohwi, Fl. Japan 689. 1956; 东北植物检索表 1986. 1959; 东北草本植物志 5: 157. 1976. (non *Pisum maritimum* Linn.) — *Pisum maritimum* Linn. Sp. Pl. 727. 1753.

海滨山黧豆(变型)

f. *japonicus*

多年生草本，根状茎极长，横走。茎长 15—50 厘米，常匍匐，上升，无毛。托叶箭形，长 10—29 毫米，宽 6—17 毫米，网脉明显凸出，无毛；叶轴末端具卷须，单一或分枝；小叶 3—5 对，长椭圆形或长倒卵形，长 25—33 毫米，宽 11—18 毫米，先端圆或急尖，基部宽楔形，两面无毛，具羽状脉，网脉两面显著隆起。总状花序比叶短，有花 2—5 朵，花梗长 3—5 毫米；萼钟状，长 9—10 (—12) 毫米，最下面萼齿长 5—6 (—8) 毫