

出，先端具短喙，被毛，有种子2—3粒。花果期4—9月。

原产欧洲西北部，我国见于栽培，供观赏用。

4. 黄芒柄花

Ononis natrix Linn. Sp. Pl. 717. 1753; Huber-Morath in Davis, Fl. Turkey 3: 376. 1970.

常绿小灌木，高10—70厘米，全株被腺毛和粘毛。茎直立，自基部分枝，密集成丛；无刺。羽状复叶为3小叶，通常在枝梢为1叶单生，茎下部繁茂时多达5枚；托叶长圆状披针形，与叶柄近等长，下半部与叶柄合生，茎基部托叶干枯后呈黄色，宿存；小叶长圆形、倒卵形至阔线形，长1—6厘米，先端钝或锐尖，边缘多少呈锯齿状。花通常单生叶腋，于枝梢形成疏松的带叶总状花序；花梗长5—20毫米，中部有1芒刺状尖突；花萼钟形，长8—12毫米，萼齿深裂。线状披针形，明显长于萼筒；花冠黄色，长12—20毫米，旗瓣最大，倒卵状圆形，背面有深红色或紫色脉纹，翼瓣稍短，龙骨瓣最短。荚果线形，长1—2厘米，宽3—4毫米，比萼长2—3倍，先端具喙，密被硬毛，开裂，有种子6—9粒；种子圆形，种皮具疣。花果期5—10月。

原产欧洲地中海北岸，我国栽培供观赏用。

114. 紫雀花属* *Parochetus* Buch.-Ham. ex D. Don

D. Don Prodr. Fl. Nepal. 240. 1825; Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenf.

3(3): 243. 1894; Hutch. Gen. Flow. Pl. 1: 456. 1964.

多年生柔细草本。掌状三出复叶；托叶的基部与叶柄稍连合；叶柄细长。花1—3朵组成伞形花序，着生于细长总花梗的顶端；苞片2—4枚，托叶状，分离，无小苞片；花具梗；萼钟形，具脉纹15—20条，萼齿5，略不等长，上方2齿连合较高，下方1齿稍长；花冠与雄蕊筒分离；雄蕊两体，上方1枚分离，在中部与雄蕊筒连合，其余9枚合生，连合部位达五分之四以上，花丝先端不膨大，花药同型；子房无柄，胚珠多数，花柱上弯，无毛，柱头小，顶生。荚果线形，膨胀，稍压扁，先端斜截形，2瓣裂，种子间无隔膜。种子肾形，种脐侧生，无种阜，具1丝状珠柄。

属名模式：紫雀花 *Parochetus communis* Buch.-Ham. ex D. Don

单种属，产热带亚洲和非洲的山地。我国西南高原地带分布。

1. 紫雀花(中国植物科属检索表) 金雀花(中国主要植物图说·豆科) 图版76: 1—7

Parochetus communis Buch.-Ham. ex D. Don Prodr. Fl. Nepal. 240. 1825; DC. Prodr. 2: 403. 1825; Royle Illustr. Bot. Himal. Mount. 201. t. 35. 1835; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 86. 1976; 中国主要植物图说·豆科 186. 1955; Ohashi in Hara, Fl. E. Himal. 160.

* 属的异名：金雀花属(中国主要植物图说·豆科)