

Crotalaria peguana Benth. ex Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 77. 1876; 中国主要植物图说·豆科 175. 图 166. 1955; Chun-yu Yang in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 7: 111. 1980.

灌木状直立草本，高 80—150 厘米；茎枝圆柱形，被贴伏的短柔毛。托叶极细小，刚毛状；单叶，叶片长椭圆形，两端渐尖，长 6—11 厘米，宽 2—3 厘米，上面近无毛，下面披丝质短柔毛，薄纸质，叶脉在叶上面不明显，在叶下面凸起，清晰可见，具短柄，长 1—2 毫米。总状花序顶生或腋生，有花多朵，花序长达 20 厘米；苞片线形，长 3—4 毫米，小苞片与苞片同形，成双生于萼筒基部或花梗中部以上，花梗长 3—5 毫米；花萼二唇形，长 8—12 毫米，深裂，几达基部，萼齿线形或线状披针形，先端渐尖，被短柔毛；花冠黄色，包被萼内或与之等长，旗瓣长圆形或卵状长圆形，长 8—12 毫米，先端和上面靠上方有束状柔毛，基部具胼胝体二枚，翼瓣长圆形，先端圆，长 8—10 毫米，龙骨瓣通常比旗瓣稍短，长约 9 毫米，弯曲，具长喙；子房无柄。荚果长圆形，无毛，长 10—20 (—25) 毫米，径 5—10 毫米；种子 8—15 颗。 花果期 6—12 月间。

产广西、云南。生灌丛及山坡疏林。海拔 900—1 500 米。印度、缅甸、越南也有分布。本种模式标本采自缅甸。

19. 邱北猪屎豆 (东北林学院植物研究室汇刊, 植物研究)

Crotalaria qiubeiensis Chun-yu Yang, Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 7: 115. 1980 et Bull. Bot. Res. 3(4): 107. 1983; J. Q. Li in Journ. Wuh. Bot. Res. 6(3): 221. 1988.

高大直立草本，高 60—120 厘米，茎枝圆柱形，被贴伏的短柔毛。托叶无；单叶，厚纸质，叶片长椭圆形，先端渐尖，基部略楔形，两面被锈色柔毛，叶脉在上面隐见，在下面清晰，稍凸起，侧脉 6—10 对；叶柄短，长约 2 毫米。总状花序顶生或腋生，有花 5—30 朵，花序长达 10 厘米；苞片小，长约 2 毫米，小苞片与苞片同形，生花梗中部以上，密被锈色柔毛；花萼二唇形，长约 8 毫米，上面二萼齿先端钝尖，下面三萼齿披针形，先端渐尖；花冠黄色，伸出萼外，旗瓣倒卵圆形，长 10—12 毫米，基部具胼胝体二枚，垫状，翼瓣长圆形，比旗瓣稍短，龙骨瓣弯曲，具长喙；子房无柄。荚果圆柱形，长约 2 厘米；种子 10—15 颗。 花果期 10 月前后。

产云南邱北。生荒山草地及山坡灌丛中。海拔 800—1 500 米。模式标本采自云南邱北。

20. 假地蓝 (中国主要植物图说·豆科) 大响铃豆(云南), 野花生 (台湾植物志), 黄花野百合 (江西) 图版 91: 9—13

Crotalaria ferruginea Grah. ex Benth. in London Journ. Bot. 2: 476. 1843; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 68. 1876; 中国主要植物图说·豆科 171. 图 161. 1955; 中国高等植物图鉴 2: 368. 图 2465. 1972; 台湾植物志 3: 228. 1977; J. Q. Li in Journ. Wuh. Bot. Res. 6(3): 224. 1988. — *C. rufescens* Franch. Pl. David. 79. 1884. — *C. pilosissima* Miq. Fl. Ind.