

种子6—12颗。 花果期5月至12月间。

产安徽、江西、福建、湖南、贵州、广东、海南、广西、四川、云南。生荒地路旁及山坡疏林下。海拔200—2800米。中南半岛、南亚及太平洋诸岛也有分布。本种模式标本采自印度。

本种可供药用，可清热解毒，消肿止痛，治跌打损伤，关节肿痛等症。抗癌作用同大猪屎豆。

29. 湿生猪屎豆 (植物分类学报)

Crotalaria uliginosa Huang in Acta Phytotax Sin. 6: 396. 1957; Chun-yu Yang in Bull. Bot. Lab. North.-East. Forest. Inst. 7: 118. 1980 et Bull. Bot. Res. 3(4): 111. 1983; J. Q. Li in Journ. Wuh. Bot. Res. 6(3): 225. 1988.

草本，高约20厘米；常基部生出分枝，扩展，细弱，初被贴伏的疏柔毛，后渐无毛。托叶极细小，刚毛状，长不及1毫米；单叶，生于枝下部的为长圆状倒披针形或长圆状椭圆形，生于茎枝上部的为线状椭圆形，长7—15毫米，稀10—20毫米，宽3—5毫米，先端圆，稀截形，具短尖头，基部阔楔形或近圆形，全缘，干后膜质，上面绿色，近无毛，下面淡绿色，被贴伏的疏柔毛，中脉在叶上面不明显，在下面凸起，侧脉隐见；叶柄无毛。总花梗腋生，长1—3厘米，通常有2花，稀1花；花梗长2—3毫米；花萼二唇形，长4—5毫米，萼齿披针形，先端渐尖；小苞片二枚，线形，长约0.5毫米，生萼筒基部；花冠黄色，旗瓣广倒卵形，先端近圆，长4—5毫米，宽3—4毫米，基部具二枚胼胝体，翼瓣长圆形，长约4毫米，龙骨瓣比翼瓣稍长，弯曲，近90度，中部以上变狭，形成长喙；花柱长约2.5毫米；子房无柄。荚果短圆柱形，长约10—15毫米，径约5毫米，秃净无毛，基部常有宿存的花萼和花丝；种子8—15颗，肾形，长约1毫米，光亮。

产云南砚山。生河边湿地。模式标本采自云南砚山县盆龙村。

30. 云南猪屎豆 (中国主要植物图说·豆科) 图版94: 7—12

Crotalaria yunnanensis Franch. Pl. Delav. 151. 1890; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 545. 1931; 中国主要植物图说·豆科 176. 1955; Chun-yu Yang in Bull Bot. Res. 3(4): 111. 1983; J. Q. Li in Journ. Wuh. Bot. Res. 6(3): 226. 1988.

直立草本，地下根茎常很发达，高15—30厘米；具分枝，被粗糙开展的褐色长柔毛。无托叶；单叶，叶长圆形或椭圆形，长2—3厘米，宽0.5—1.5厘米，先端钝或渐窄，具短尖头，基部略楔形，两面被疏离的褐色长柔毛，尤以下面中脉毛更密，叶脉在上面隐见，在下凸起，侧脉不甚明显；柄长1.5毫米。总状花序顶生，或腋生，有花5—20朵，花序长5—10厘米；苞片线形，长2—4毫米，与花梗近等长，小苞片与苞片相似，生萼筒基部，被长柔毛；花萼二唇形，长5—7毫米，萼齿披针形，密被褐色长柔毛；花冠黄色，旗瓣圆形或阔圆形，直径9—11毫米，基部胼胝体垫状，翼瓣倒卵状长圆形，长7—10毫米，龙骨瓣与翼瓣近等长，弯曲，中部以上变狭形成长喙。荚果短圆柱形，长约1厘米，无毛。 花果期5—10月间。