

产四川、云南等地。生山坡薄土中。海拔约 100—3 000 米。模式标本采自云南剑川。

31. 鹤庆猪屎豆 (东北林学院植物研究室汇刊)

Crotalaria heqingensis Chun-yu Yang in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 7: 112—113, 1980 et Bull. Bot. Res. 3(4): 111, 1983; J. Q. Li in Journ. Wuh. Bot. Res. 6(3): 220, 1988.

草本，高 40—70 厘米；茎纤细，被棕黄色伸展的长柔毛。无托叶；单叶，质薄，叶片生于茎基部的长圆形，两端钝圆，生于茎枝上部的叶披针形，先端渐尖，基部钝圆或略楔形，长 2—6 厘米，宽 1—2.5 厘米，上面被稀疏伸展的长柔毛，下面中脉及叶边缘毛较多，侧脉 4—6 对；叶柄长 1—2 毫米。总状花序顶生，有花 10—30 朵，花序长 10—20 厘米，花梗长 2—4 毫米；苞片披针形，稍弯曲，长 6—9 毫米，远比花梗长，小苞片与苞片同形，稍短，长约 6 毫米，生萼筒基部；花萼二唇形，长约 10 毫米，深裂，几达基部，萼齿披针形，先端渐尖；花冠淡黄色，与花萼等长或稍长，旗瓣卵圆形或圆形，长 8—9 毫米，基部胼胝体二枚，垫伏，翼瓣长圆形，比旗瓣稍短，龙骨瓣弯曲，具喙。荚果未见。花期 8 月。

产云南鹤庆。生山坡疏林。海拔 1 500—2 000 米。模式标本采自云南鹤庆县黄坪大龙潭。

32. 俯伏猪屎豆 (东北林学院植物研究室汇刊)

Crotalaria prostrata Rottler ex Willd. Enum. Pl. Hort. Berol 744, 1809; Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 67, 1876; Ali in Nasir et Ali, Fl. W. Pakistan 100: 49, 1977; Chun-yu Yang in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 7: 116, 1980 et Bull. Bot. Res. 3(4): 112, 1983; J. Q. Li in Journ. Wuh. Bot. Res. 6(3): 224, 1988. — *C. prostrata* Roxb. ex D. Don, Fl. Nepal. 241, 1825. — *C. prostrata* Roxb. Fl. Ind. 3: 270, 1832.

32a. 俯伏猪屎豆(原变种)

var. *prostrata*

铺地散生草本；茎枝细弱；密被褐色伸展短柔毛。无托叶；单叶，叶片椭圆形或卵状长圆形，长 1—3 厘米，宽 0.5—1 厘米，两面被毛，先端钝圆，基部通常偏斜；叶柄无毛。总状花序顶生，有花 2—4 朵；苞片钻状，小苞片与苞片同形，生萼筒基部，密被褐色柔毛；花梗长 1—2 毫米；花萼二唇，长 3—4 毫米，深裂，萼齿披针形；花冠黄色，旗瓣圆形或椭圆形，先端钝圆或凹，长约 3 毫米，翼瓣长圆形，约与旗瓣等长，龙骨瓣中部以上变狭，弯曲，形成长喙，花冠包被萼内；子房无柄。荚果短圆柱形，长约 10 毫米；种子 10—15 颗。花果期 8—12 月间。

产云南。生草山湿地。海拔 100—1 300 米。印度、尼泊尔、马来西亚、斯里兰卡也有分布。本种模式标本采自印度。

32b. 金平猪屎豆 (东北林学院植物研究室汇刊) (变种)