

var. *jipingensis* (Chun-yu Yang) Chun-yu Yang stat. nov. — *C. jipingensis* Chun-yu Yang in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 7: 113. 1980 et Bull. Bot. Res. 3: 113. 1983; J. Q. Li in Journ. Wuh. Bot. Res. 6(3): 220. 1988.

本变种以全株密被白色贴伏柔毛，叶较小，总状花序顶生或腋生，有花2—5朵，但多数不发育，常1—12朵生于总花梗，花冠外露等与原变种区别。花果期5月前后。

产云南金平。生山坡草地。海拔850米。模式标本采自云南金平。

33. 耿马猪屎豆 (植物分类学报)

Crotalaria gengmaensis Z. Wei et Chun-yu Yang in Acta Phytotax. Sin. 20(4): 479. 1982 et Bull. Bot. Res. 3(4): 113. 1983; J. Q. Li in Journ. Wuh. Bot. Res. 6(3): 220. 1988.

多年生铺地草本，体高约10厘米；茎枝圆柱形，基部多分枝，纤细，被稀疏伸展的长柔毛。无托叶；单叶，叶片膜质，椭圆形，长1—2厘米，宽4—8毫米，先端渐尖或钝，具短尖头，基部渐狭，两面被毛；叶柄短。总状花序顶生，有花2—5朵或有时为单花，花序长3—5厘米；苞片针形，长1—2毫米，小苞片与苞片相似，生萼筒基部；花梗长3—5毫米；花萼二唇形，长4—5毫米，深裂，萼齿披针形，长于萼筒，先端渐尖；花冠黄色，旗瓣圆形，长约5毫米，先端钝圆或凹，翼瓣长圆形，约与旗瓣等长，龙骨瓣卵圆形，中部以上变狭，形成明显的喙，稍扭转，伸出萼外；子房无柄，近无毛。荚果短圆柱形，长10—15毫米；种子6—8颗。花果期4—12月间。

产云南耿马。生山坡草地。海拔1670米。模式标本采自云南耿马。

34. 屏东猪屎豆 (东北林学院植物研究室汇刊) 鹅銮鼻野百合 (台湾植物志) 图版95: 1—7

Crotalaria similis Hemsl. in Kew Journ. Bot. 4: 44. 1852; Matsumura et Hayata in Journ. Boll. Sci. Univ. Tokyo 22: 103. 1906; 台湾植物志 3: 237. 1977.

铺地小草本；茎长5—20厘米，全株密被丝质长柔毛。无托叶；单叶，叶片卵形或椭圆形，长3—8毫米，宽2—4毫米，先端急尖，基部钝圆，上面无毛，下面密被长柔毛；叶柄短。总状花序顶生，有花3—5朵，也有时单花生枝顶；苞片较小，披针形，小苞片与苞片同形，生萼筒基部；花梗短；花萼二唇形，长约6毫米，上面二萼齿阔披针形，下面三萼齿较窄，通常为披针形，密被丝质长柔毛；花冠黄色，旗瓣长圆形或圆形，长约6毫米，先端具束状毛，翼瓣长圆形，约与旗瓣等长，龙骨瓣近直生，基部边缘具柔毛，稍长于旗瓣；子房无柄。荚果短圆柱形，长约1厘米；种子10—20颗。

产台湾。生沙质土壤中。新西兰也有分布。模式标本采自我国台湾南部。

系4. 球果系 Ser. Globosae Chun-yu Yang in Bull. Bot. Research 3(4): 113. 1983.

直立或铺地草本，托叶不存在或丝状，通常早落，花冠小，长4—5（—7）毫米，荚果卵状球形，直径4—5（—7）毫米，种子6—8（—10）颗。

系名模式: *Crotalaria linifolia* Linn. f.