

本种可供药用，可清热解毒，消肿止痛，治耳鸣、遗精、妇女血癆，外用治疮痛、癬疥等症。抗癌同大猪屎豆。

36b. 狭叶猪屎豆 (变种)

var. **stenophylla** (Vogel) Chun-yu Yang in Acta Phytotax. Sin. 20(4): 479, 1982. — *C. stenophylla* Vogel in Nova Acta Nat. Cur. 65, Suppl. 1: 7, 1843.

本变种植物体比较矮小，叶片狭线形或线状长圆形，长 2.5—3.5 厘米，宽 3—4 毫米，先端钝圆，具短尖头，基部圆；叶柄短；荚果卵球形或四角菱形，直径 4—6 毫米区别于原变种。

产台湾、湖南、广东、广西。生山谷路旁及海滩沙地。

37. 小猪屎豆 (植物研究) 小野百合 (海南植物志)

Crotalaria nana Burm. f. Fl. Ind. 156, t. 48, f. 2, 1768; DC. Prodr. 2: 127, 1825; 海南植物志 2: 250, 1965.

37a. 小猪屎豆(原变种)

var. **nana**

我国不产。

37b. 座地猪屎豆 (变种)

var. **patula** Grah. ex Baker in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 71, 1876; 海南植物志 2: 251, 1965; Chun-yu Yang in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. 7: 109, 1980 et Bull. Bot. Res. 4(3): 114, 1983.

平卧或近直立草本；茎枝圆柱形，密被黄色丝质柔毛，基部多分枝，主根发达，呈木质状，长达 14 厘米。无托叶；单叶，近无柄，狭线形，长 15—30 毫米，宽 2—4 毫米，先端钝圆，具短尖头，基部略楔形，两面均被丝质毛，尤以下面毛更密，侧脉不甚明显。总状花序顶生，头状，有花 2—6 朵；苞片线形，长 2—3 毫米，小苞片锥状，长约 3 毫米，密被丝质柔毛，花梗短；花萼二唇形，上唇二萼齿合生，近长圆形，先端钝圆，下唇三萼齿披针状三角形，长 4—5 毫米；花冠黄色，比萼片稍短，通常包被萼内；子房无柄。荚果卵圆形或近球形，长 4—5 毫米；花柱宿存；种子 6—12 颗。

产海南。生于旱荒地及沙质土壤中。海拔 50—2 000 米。分布到缅甸、印度、尼泊尔。本变种模式标本采自印度。

组 5. 双子组 Sect. Dispermae Wight et Arn. Prodr. Fl. Ind. Or. 1: 191, 1834; Polhill in Kew Bull. 22, 2: 321, 1968.

通常为三小叶，托叶有或无，花萼近钟形，五裂，萼齿近等长，与花冠等长或稍短，龙骨瓣喙部扭转，荚果圆球形，稀短圆柱形，伸出或包被萼内，种子二颗。

组名模式：假苜蓿 *Crotalaria medicaginea* Lamk.

约 145 种，主要分布在非洲热带地区。中国有 3 种 1 变种，产台湾、广东、海南、广