

一年生草本，高 40—100 厘米。茎直立或上升，下部分枝，被白色柔毛，有时呈锈色。掌状复叶，小叶 6—11 枚；叶柄远长于小叶片；托叶钻形，基部与叶柄连生，长 1—2 厘米；小叶形状各异，倒披针形至狭倒卵形，长 4—8 厘米，宽约 1 厘米，先端钝至锐尖，基部渐狭成楔形，两面被贴伏绢毛，下面尤密，中脉清晰，侧脉不明显。总状花序顶生，花序轴长于复叶；花长 1.3—1.7 厘米，轮生；苞片小，披针状钻形，通常早落；花梗短；萼二唇形，下唇较长，具 3 齿尖，上唇较短，具 2 齿尖；花冠黄色，芳香，花瓣近等长，龙骨瓣尖端多少呈紫色，荚果长圆状线形，长 3.5—6 厘米，宽 1—1.4 厘米，密被锈色绢状长柔毛，种子间节荚状；有种子 3—4 粒；花萼宿存。种子扁圆形，径 7 毫米，淡红色，具棕色和白色混杂斑点，平滑。花期 3—5 月，果期 5—7 月。

原产地中海区域，我国见于栽培。

本种适于贫瘠土地作绿肥用；鲜种子含毒羽扇豆碱，但原产地经加工处理后可代咖啡。

6. 白羽扇豆(经济植物手册) 图版 107: 15—17

Lupinus albus Linn. Sp. Pl. 721. 1753; Palib. in Kom. Fl. URSS 11: 50. 1945; Amaral Franco & Pinto da Silva in Tutin et al. Fl. Europ. 2: 105. 1968; Chamberlain in Davis, Fl. Turkey 3: 38. 1970; Gladstones in Techn. Bull. Dept. Agr. W. Austral. 26: 5. 1974; Ali in Nasir et Ali, Fl. W. Pakistan 100: 34. 1977. — *L. termis* Forssk. Fl. Aeg.-Arab. 131. 1775; Boiss. Fl. Or. 2: 1872; Reichb. Fl. Germ. 2: t. 10. 1903.

一年生草本，高 20—120 厘米。茎直立，粗壮，被贴伏或伸展的绢状长柔毛。掌状复叶，小叶 5—9 枚；叶柄长于小叶片；托叶钻形，先端锥尖，长 1.5—2 厘米，基部稍与叶柄连生，被毛；小叶长圆状披针形至倒卵形，长 25—40 毫米，宽 12—18 毫米，先端钝至锐尖，基部楔形，边缘睫毛状，上面无毛，下面被贴伏柔毛，中脉细，上面平坦，下面稍隆起，侧脉不明显。总状花序多花，长 5—10 厘米，顶生；花序轴长于叶；花长约 1.5 厘米，互生；苞片钻形，早落；花梗短，长 3—5 毫米；小苞片短，线形；萼二唇形，长 8—9 毫米，绿色或淡蓝色，被毛，下唇长于上唇，在果期宿存；花冠白色，旗瓣先端蓝色，与翼瓣等长，龙骨瓣尖头。荚果线形，扁平，长 4—6 厘米，宽 8—13 毫米，密被长柔毛，后渐秃净，先端具尖喙；有种子 2—4 粒。种子凸镜形，白色至淡棕色，平滑。花期 2—4 月，果期 3—6 月。

原产地中海区域，我国见于栽培。

作饲料与绿肥，又可作观赏用。

7. 毛羽扇豆(经济植物手册)

Lupinus pubescens Benth. Pl. Hartw. 169. 1845; C. P. Smith Sp. Lupin 172. 1940; Gillett et al. Fl. Trop. E. Afr. Legum. (4): 998. 1971.

一年生或短期多年生草本，高达 1 米。茎直立，上部多分枝，密被白色柔毛，通常为卷曲毛和伸展毛交杂。掌状复叶，小叶 7—9 枚；叶柄与小叶片等长或稍长；托叶钻状线

形，长3—8毫米；小叶倒披针状至狭长圆形，长30—50毫米；宽5—12毫米，先端钝，基部狭楔形，两面密被柔毛。总状花序长10—35厘米；花长10—15毫米，多数，近轮生；苞片披针形，渐尖，长6—8毫米；花梗短，长2—4毫米；萼长7—9毫米，密被绒毛，上唇2齿尖，下唇几全缘或3齿尖；花冠白色、淡蓝色至紫色，旗瓣圆形，中央有淡红色晕斑。荚果长圆状椭圆形，长2.5—4厘米，宽1—1.3厘米，密被长柔毛，先端具短喙；有种子4—6粒。种子长圆状椭圆形，长6毫米，宽4毫米，淡棕色，具深褐色斑纹，每侧有1条黑线，平滑。

原产南美洲，我国见于栽培。

127. 毒豆属* *Laburnum* Fabr.

Fabr. Enum. Meth. Pl. 228. 1759. nom.; Medic. Philos. Bot. 1: 201. 1779.
nom.; id. Vorles. Churpf. Phys.—Okon. Gen. 2: 362. 1787; Engl. u.
Prantl. Nat. Pflanzenf. 3(3): 236. 1894; Hutch. Gen. Flow. Pl. 1: 355.
1964; Polhill in Bot. Syst. 1: 332. 1976.

落叶乔木或小乔木。具长枝与短枝。掌状三出复叶，具叶柄；小叶全缘；托叶小。总状花序顶生于无叶枝端，下垂；苞片和小苞片均小，萼近二唇形或不对称的钟形，萼齿不明显；花冠黄色，旗瓣卵形或圆形，翼瓣倒卵形，龙骨瓣弯曲，短于翼瓣，瓣柄均分离；雄蕊单体，合生成闭合的雄蕊筒，花药两型，长短交互，底着和背着；子房具柄，胚珠多数，花柱无毛，上弯，柱头顶生。荚果线形，扁平，具颈，缝线增厚，2瓣裂。种子肾形，无种阜，珠柄甚短。

属名模式：毒豆 *Laburnum anagyroides* Medic.

本属2种，产欧洲、北非、西亚。我国栽培1种。

1. 毒豆(中国植物科属检索表) 金链花 图版 108: 16—17

Laburnum anagyroides Medic. Vorles. Churpf. Phys.—Okon. Gen. 2: 363. 1787; Fordin & Heywood in Tutin et al. Fl. Europ. 2: 86. 1968; Ali in Nasir et Ali, Fl. W. Pakistan 100: 311. 1977. — *Cytisus laburnum* Linn. Sp. Pl. 739. 1753; Ledeb. Fl. Ross. 1: 521. 1842; Paker, For. Fl. Punj. ed. 3: 170. 1956.

小乔木，高2—5米。嫩枝被黄色贴伏毛，后渐脱落，枝条平展或下垂，老枝褐色，光滑。三出复叶，具长柄，长3—8厘米；托叶细小，早落；小叶椭圆形至长圆状椭圆形，长3—8厘米，宽1.5—3厘米，纸质，先端钝圆，具细尖，基部阔楔形，上面平坦近无毛，下面被贴伏细毛，脉上较密，侧脉6—7对，近叶边分叉不明显。总状花序顶生，下垂，长10—30厘米；花序轴被银白色柔毛；苞片线形，早落；花长约2厘米，多数；