

形，长3—8毫米；小叶倒披针状至狭长圆形，长30—50毫米；宽5—12毫米，先端钝，基部狭楔形，两面密被柔毛。总状花序长10—35厘米；花长10—15毫米，多数，近轮生；苞片披针形，渐尖，长6—8毫米；花梗短，长2—4毫米；萼长7—9毫米，密被绒毛，上唇2齿尖，下唇几全缘或3齿尖；花冠白色、淡蓝色至紫色，旗瓣圆形，中央有淡红色晕斑。荚果长圆状椭圆形，长2.5—4厘米，宽1—1.3厘米，密被长柔毛，先端具短喙；有种子4—6粒。种子长圆状椭圆形，长6毫米，宽4毫米，淡棕色，具深褐色斑纹，每侧有1条黑线，平滑。

原产南美洲，我国见于栽培。

127. 毒豆属* *Laburnum* Fabr.

Fabr. Enum. Meth. Pl. 228. 1759. nom.; Medic. Philos. Bot. 1: 201. 1779.
nom.; id. Vorles. Churpf. Phys.—Okon. Gen. 2: 362. 1787; Engl. u.
Prantl. Nat. Pflanzenf. 3(3): 236. 1894; Hutch. Gen. Flow. Pl. 1: 355.
1964; Polhill in Bot. Syst. 1: 332. 1976.

落叶乔木或小乔木。具长枝与短枝。掌状三出复叶，具叶柄；小叶全缘；托叶小。总状花序顶生于无叶枝端，下垂；苞片和小苞片均小，萼近二唇形或不对称的钟形，萼齿不明显；花冠黄色，旗瓣卵形或圆形，翼瓣倒卵形，龙骨瓣弯曲，短于翼瓣，瓣柄均分离；雄蕊单体，合生成闭合的雄蕊筒，花药两型，长短交互，底着和背着；子房具柄，胚珠多数，花柱无毛，上弯，柱头顶生。荚果线形，扁平，具颈，缝线增厚，2瓣裂。种子肾形，无种阜，珠柄甚短。

属名模式：毒豆 *Laburnum anagyroides* Medic.

本属2种，产欧洲、北非、西亚。我国栽培1种。

1. 毒豆(中国植物科属检索表) 金链花 图版 108: 16—17

Laburnum anagyroides Medic. Vorles. Churpf. Phys.—Okon. Gen. 2: 363. 1787; Fordin & Heywood in Tutin et al. Fl. Europ. 2: 86. 1968; Ali in Nasir et Ali, Fl. W. Pakistan 100: 311. 1977. — *Cytisus laburnum* Linn. Sp. Pl. 739. 1753; Ledeb. Fl. Ross. 1: 521. 1842; Paker, For. Fl. Punj. ed. 3: 170. 1956.

小乔木，高2—5米。嫩枝被黄色贴伏毛，后渐脱落，枝条平展或下垂，老枝褐色，光滑。三出复叶，具长柄，长3—8厘米；托叶细小，早落；小叶椭圆形至长圆状椭圆形，长3—8厘米，宽1.5—3厘米，纸质，先端钝圆，具细尖，基部阔楔形，上面平坦近无毛，下面被贴伏细毛，脉上较密，侧脉6—7对，近叶边分叉不明显。总状花序顶生，下垂，长10—30厘米；花序轴被银白色柔毛；苞片线形，早落；花长约2厘米，多数；