

花梗细，长8—14毫米；小苞片线形；萼歪钟形，稍呈二唇状，长约5毫米，上方2齿尖，下方3齿尖，均甚短，被贴伏细毛；花冠黄色，无毛，旗瓣阔卵形，先端微凹，基部心形，具短瓣柄，翼瓣几与旗瓣等长，长圆形，先端钝，基部具耳，龙骨瓣阔镰形，比前二者短三分之一；雄蕊单体；子房线形，具柄，胚珠8粒，花柱细，短于子房。荚果线形，长4—8厘米，先端锐尖，基部楔形，缝线增厚，被贴伏柔毛。种子黑色。花期4—6月，果期8月。

原产欧洲南部，我国东北、西北有栽培。

本种树冠端正整齐，花金黄色甚美丽。木材坚韧，供家具和工具用；全株有毒，尤以果实和种子为甚。易驯化，常栽培作庭园树，并育成一些栽培变型，供观赏。国外曾用本种与紫金雀花 *Cytisus purpureus* Scop. 进行无性杂交育成人工新属金雀毒豆属 *Laburnocytisus* C. K. Schneid. *Illustr. Handb. Laubholz* 2: 40. 1907., 新属具有类似亲本之特征，花时而金黄色，时而玫瑰色，甚艳丽。

## 128. 金雀儿属 *Cytisus* Linn.

Linn. *Sp. Pl.* 739. 1753 et *Gen. Pl.* ed. 5: 328. 1754; Engl. u. Prantl, *Nat. Pflanzenf.* 3(3): 239. 1894; Hutch. *Gen. Flow. Pl.* 1: 351. 1964. — *Sarothamnus* Wimm. ex Koch, *Fl. Schles.* 278. 1832. — *Lembotropis* Griseb. *Spicileg. Fl. Rumel.* 1: 10. 1843.

灌木或小乔木。常为掌状三出复叶，有时单叶或无叶；托叶小，针刺状或不明显。总状花序顶生时则甚长，叶腋生时则短，几成簇生；苞片和小苞片均小，早落；萼二唇形，萼齿短小，上方2齿连合或分离，下方3齿细尖；花冠黄色，偶为紫色或白色，旗瓣圆形或卵形，翼瓣倒卵形或长圆形，龙骨瓣弯曲，先端钝或偶为渐尖，均无毛，瓣柄分离；雄蕊10枚，连合成闭合的雄蕊筒，花丝细，花药二型，长短交互，背着和底着；子房无柄或具短柄，通常被毛，胚珠多数，花柱无毛，细长，旋曲，柱头顶生，头状或歪形。荚果扁平，长圆形至线形，2瓣裂。种子具种阜。

属名模式: *Cytisus sessilifolius* Linn.

本属约50种，产欧洲、亚洲西部和非洲北部。我国有2种，见于栽培。

## 金雀儿属分种检索表

1. 花在茎梢腋生，基部有叶，花柱伸出花冠，并向内螺旋卷曲，比龙骨瓣长；枝具棱；全株干后呈暗绿色 ..... 1. 金雀儿 *C. scoparius* (Linn.) Link
1. 花序顶生，总状近轮生，基部无叶，花柱上弯不伸出；枝圆柱形；全株干后呈黑色 ..... 2. 变黑金雀儿 *C. nigricans* Linn.