

属名模式：荆豆 *Ulex europaeus* Linn.

本属约 20 种，产欧洲西部、非洲。我国有 1 种，见于栽培，稀逸生。


1. 荆豆(经济植物手册) 图版 109: 6—7

*Ulex europaeus* Linn. Sp. Pl. 741. 1753; Schischk. in Kom. Fl. URSS 11: 72. 1945; Guinea & Webb in Tutin et al. Fl. Europ. 2: 102. 1968; Davis, Fl. Turkey 3: 24. 1970.

多刺灌木，高 50—150 厘米。茎圆柱形，具纵长直棱，密被疏散长柔毛，多分枝，小枝先端均变为尖刺；簇生的叶柄也变为较小的尖刺，长 5—15 毫米，密集，均具细棱。花 1—3 朵腋生，在茎上部形成复总状花序；苞片小，卵圆形，长约 2 毫米；花长 13—15 毫米，稍比萼长；花梗长 3—9 毫米；小苞片阔卵形，长约 2 毫米，与苞片、花梗均密被褐色绒毛；萼膜质，黄褐色，长 12—14 毫米，密被褐色细绒毛，二唇形，深裂几达基部；花冠鲜黄色，旗瓣倒卵形，先端微凹，翼瓣椭圆形，均无毛，龙骨瓣长圆形，下侧边缘具绒毛；雄蕊单体，花药二型。荚果狭卵形，长 11—20 毫米，密被褐色绒毛，包藏于宿存花萼中；有种子 2—4 粒。种子卵圆形，长 3 毫米，宽 2 毫米，黑褐色，具光泽，种阜淡黄色，围绕珠柄。

原产欧洲，我国常见栽培。在四川城口附近有逸出的大片居群，原系法国神父引种于教堂附近的。

本种花芳香，作观赏用。在原产地作家畜饲料用。



图版 109 1—2. 金雀儿 *Cytisus scoparius* (Linn.) Link: 1. 花枝; 2. 荚果。3—5. 鹰爪豆 *Spartium juncifolium* Linn.: 3. 花序; 4. 茎、叶一段; 5. 荚果。6—7. 荆豆 *Ulex europaeae* Linn.: 6. 果枝; 7. 荚果。(何冬泉绘)