

棕色；雌蕊密被短糙毛，花柱分枝深棕色。蒴果长约2厘米，被短糙毛。花期6—7月，果期7—8月。

分布于四川（南川）。生于海拔2200米左右山地草甸、林缘或杂草山坡。模式标本产于四川南川（金佛山）。

本种很近似湖北老鹳草 *G. rosthornii* R. Knuth，仅叶最终裂片较狭。

3. 天竺葵属 *Pelargonium* L' Hér.

L' Hér. in Ait. Hort. Kew. 2: 417. 1789; DC. Prodr. 1: 649. 1824.

草本、亚灌木或灌木，具浓裂香气。茎略呈肉质。叶对生或互生；叶片圆形、肾圆形或扇形，不分裂或掌状分裂。边缘波状，具齿；具托叶。花序通常为伞形或聚伞花序，稀为花单生，总花梗腋生或与叶对生；具苞片；花通常两侧对称，萼片5，覆瓦状排列，基部合生，近轴1枚延伸成长距并与花梗合生；花瓣5，覆瓦状排列，上方2枚较大而同形，下方3枚同形；无蜜腺；雄蕊10，花丝基部通常合生或偏生，其中1—3枚无药或花药发育不全；子房合生，5心皮，5室，每室具2枚胚珠，花柱分枝5。蒴果具喙，5裂，成熟时果瓣由基部向上卷曲，附于喙的顶端，每室具1种子。种子无胚乳。包于两子叶之间。

本属约250种，主要分布于热带，特别集中分布于南非。我国已知较为普遍引种的约5种，无野生种。

重要观赏花卉，多为盆栽。

分种检索表

1. 柔弱或平卧植物，光滑或近光滑 1. 盾叶天竺葵 *P. peltatum* (L.) Ait.
1. 直立植物，被各种毛茸，基部稍木质化。
 2. 茎肥厚肉质；叶圆形至肾形，边缘具浅钝锯齿或齿裂；有鱼腥味 2. 天竺葵 *P. hortorum* Bailey
 2. 茎略为木质；叶为各式裂或具钝齿裂；植株有时具香味。
 3. 叶成角状或仅有不明显浅裂，顶端有锐齿；花瓣宽大 3. 家天竺葵 *P. domesticum* Bailey
 3. 叶深裂近基部。
 4. 叶有香味 4. 香叶天竺葵 *P. graveolens* L' Hér.
 4. 叶无香味 5. 菊叶天竺葵 *P. radula* (Cav.) L' Hér.

1. 盾叶天竺葵 图版25: 1—3

Pelargonium peltatum (L.) Ait. Hort. Kew. 2: 427. 1789. — *Geranium peltatum* L. Sp. Pl. 678. 1753.