

本属 2 种。其中 1 种分布于我国至印度、巴基斯坦、锡金、不丹、尼泊尔、缅甸、泰国至印度尼西亚，另 1 种分布于尼泊尔和印度北部。我国仅 1 种。

1. 石海椒 (中国高等植物图鉴) 迎春柳 (云南)、黄花香草 (云南) 图版 28

Reinwardtia indica Dum. Comm. Bot. 19. 1822; Hara, Fl. E. Himal. 169. 1966; 云南种子植物名录 1: 294. 1984; 广西植物志 1: 569. 1991; 横断山区维管植物 1: 1030. 1993; H. Koba, S. Akiyama, Y. Endo et H. Ohba, Name List Fl. Pl. Gymnosp. Nepal, 432. 1994. — *R. trigyna* (Roxb.) Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. 7: 522. 1848; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 412. 1874; Franch. Pl. Delav. 109. 1889; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 616. 1933; 中国高等植物图鉴 2: 534. 图 1146. 1972; 湖北植物志 2: 323. 1979; — *Linum trigynum* Roxb. in As. Res. 6: 357. 1799 (non Linn. 1753); Levl. Fl. Kouy-Tcheou, 261. 1914.

小灌木，高达 1 米；树皮灰色，无毛，枝干后有纵沟纹。叶纸质，椭圆形或倒卵状椭圆形，长 2—8.8 厘米，宽 0.7—3.5 厘米，先端急尖或近圆形，有短尖，基部楔形，全缘或有圆齿状锯齿，表面深绿色，背面浅绿色，干后表面灰褐色，背面灰绿色，背面中脉稍凸；叶柄长 8—25 毫米；托叶小，早落。花序顶生或腋生，或单花腋生；花有大有小，直径 1.4—3 厘米；萼片 5，分离，披针形，长约 9—12 毫米，宽约 3 毫米，宿存；同一植株上的花的花瓣有 5 片有 4 片，黄色，分离，旋转排列，长 1.7—3 厘米，宽 1.3 厘米，早萎；雄蕊 5，长约 13 毫米，花丝下部两侧扩大成翅状或瓣状，基部合生成环，花药长约 2 毫米，退化雄蕊 5，锥尖状，与雄蕊互生；腺体 5，与雄蕊环合生；子房 3 室，每室有 2 小室，每小室有胚珠 1 枚；花柱 3 枚，长 7—18 毫米，下部合生，柱头头状。蒴果球形，3 裂，每裂瓣有种子 2 粒；种子具膜质翅，翅长稍短于蒴果。花果期 4—12 月，直至翌年 1 月。


分布于湖北、福建、广东、广西、四川、贵州和云南。生于海拔 550—2 300 米的林下、山坡灌丛、路旁和沟坡潮湿处，常喜生于石灰岩土壤上。印度、巴基斯坦、尼泊尔、不丹、缅甸、泰国北部、越南和印度尼西亚有分布。

花黄，颇大，常栽培供观赏。嫩枝、叶入药，有消炎解毒和清热利尿功效。

2. 青篱柴属 *Tirpitzia* Hallier

Hallier in Beih. Bot. Centralbl. 39 (2): 5. 1921.

灌木或小乔木。叶互生，具短柄；叶片椭圆形、倒卵状椭圆形或卵形，全缘，先端钝圆或急尖，基部宽楔形或近圆形。花白色，花梗短，数朵排成聚伞花序，腋生、顶生或近顶生；萼片 5，狭披针形，先端钝圆，覆瓦状排列，宿存；花瓣 5，爪细长，旋转排列成几乎粘合的管状，瓣片阔倒卵形，开展；雄蕊 5，花丝下部稍宽，基部合生成筒状；



图版 28 石海椒 *Reinwardtia indica* Dum. : 1. 花枝; 2. 雄蕊; 3. 雌蕊; 4. 果实; 5. 子房横切面。(余汉平绘)