

分布于宁夏、内蒙古巴彦淖尔盟、阿拉善盟、甘肃河西、新疆、西藏（贡噶、泽当）。生于荒漠地带干旱草地、绿洲边缘轻盐渍化沙地、壤质低山坡或河谷沙丘（达3600米）。蒙古、中亚、西亚、伊朗、印度（西北部）、地中海地区及非洲北部也有。模式标本产于地中海沿岸，存伦敦。

种子可做红色染料；榨油可供轻工业用；全草入药治关节炎，又可做杀虫剂。叶子揉碎能洗涤泥垢，代肥皂用。

2. **多裂骆驼蓬**（中国沙漠植物志） 鬣根骆驼蓬（内蒙古植物志） 图版36: 10—13

Peganum multisectum (Maxim.) Bobr. in Schischk. et Bobr. Fl. URSS **14**: 149. 1949; 中国沙漠植物志 **2**: 308. 图版107: 7—9. 1987. ——— *Peganum harmala* L. var. *multisecta* Maxim. Fl. Tangut. **1**: 103. 1889; 内蒙古植物志（二版）**3**: 418. 图版159: 4. 1989.

多年生草本，嫩时被毛。茎平卧，长30—80厘米。叶2—3回深裂，基部裂片与叶轴近垂直，裂片长6—12毫米，宽1—1.5毫米。萼片3—5深裂。花瓣淡黄色，倒卵状矩圆形，长10—15毫米，宽5—6毫米；雄蕊15，短于花瓣，基部宽展。蒴果近球形，顶部稍平扁。种子多数，略成三角形，长2—3毫米，稍弯，黑褐色，表面有小瘤状突起。花期5—7月，果期6—9月。

分布于陕西北部、内蒙古西部、宁夏、甘肃、青海。为我国特有种。生于半荒漠带沙地、黄土山坡、荒地。模式标本产于我国西北，存圣彼得堡。


3. **骆驼蒿**（中国高等植物图鉴） 图版36: 1—5

Peganum nigellastrum Bunge in Mém. Acad. Pétersb. **2**: 87. 1835; Bobr. in Schischk. et Bobr. URSS **14**: 149, 1949; 中国高等植物图鉴 **2**: 538. 图2805. 1972; 中国沙漠植物志 **2**: 306. 图版107: 1—2. 1987; 内蒙古植物志（二版）**3**: 420. 图版159: 5—6. 1989.

多年生草本，高10—25厘米，密被短硬毛。茎直立或开展，由基部多分枝。叶2—3回深裂，裂片条形，长0.7—1.0毫米，宽不到1毫米，先端渐尖。花单生于茎端或叶腋，花梗被硬毛；萼片5，披针形，长达1.5厘米，5—7条状深裂，裂片长约1厘米，宽约1毫米，宿存；花瓣淡黄色，倒披针形，长1.2—1.5厘米；雄蕊15，花丝基部扩展；子房3室。蒴果近球形，黄褐色。种子多数，纺锤形，黑褐色，表面有瘤状突起。花期5—7月，果期7—9月。2n=24。

分布于内蒙古（锡林格勒盟、乌兰查布盟、伊克昭盟、巴彦淖尔盟、阿拉善盟）、陕西北部、甘肃、宁夏。生于沙质或砾质地、山前平原、丘间低地、固定或半固定沙地。蒙古也有。模式标本产于蒙古，存巴黎。

有毒。全草入药能祛湿解毒、活血止痛、宣肺止咳；种子能活筋骨，祛风湿。



图版 36 1—5. 骆驼蒿 *Peganum nigellastrum* Bunge: 1. 花枝; 2. 花瓣; 3. 雄蕊; 4. 雌蕊; 5. 果。6—9. 骆驼蓬 *Peganum harmala* L.: 6. 花果枝; 7. 花瓣; 8. 雄蕊; 9. 雌蕊。10—13. 多裂骆驼蓬 *Peganum multisectum* (Maxim.) Bobr.: 10. 花果枝; 11. 花瓣; 12. 雄蕊; 13. 雌蕊。(陶明琴绘)