

var. **microcarpum** Y. X. Liou in Acta Phytotax. **18** (4): 485. 1980; 中国沙漠植物志 **2**: 318. 1987.

蒴果较小, 长 7—12 毫米, 宽 3—5 毫米, 翅宽 1—2 毫米。

分布于新疆哈密。生于洪积扇、戈壁滩。模式标本产于新疆哈密七角井, 存中国科学院植物研究所。

17. **大翅驼蹄瓣** 大翅霸王 (中国沙漠植物志) 图版 40: 7

Zygophyllum macropterum C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. **2**: 102. 1830; Ledeb. Fl. Ross. **1**: 484. Tab. 140. 1842; Popov in Bull. Univ. Asie. Centr. **12**: 114. Tab. 6 (3): f. 22. 1926; Boriss. in Schischk. et Bobr. Fl. URSS **14**: 182. 1949; 中国沙漠植物志 **2**: 318. 图版 111: 7—8. 1987.

17a. **大翅驼蹄瓣** (原变种)

var. **macropterum**

多年生草本, 高 5—25 厘米。根木质, 粗壮。茎开展或直立, 具糙皮刺。托叶离生, 白色膜质, 卵形或披针形, 边缘缝状或齿牙状; 叶柄长 1—2 厘米; 小叶 3—5 对, 倒卵形或矩圆形, 长 5—12 毫米, 宽 2—8 毫米。花腋生, 花梗长 2—7 毫米, 花期直立, 果期下垂; 萼片椭圆形, 钝或锐尖, 长 5—6 毫米, 宽 4—5 毫米; 花瓣倒卵形, 长于萼片, 桔红色, 先端钝或凹入; 雄蕊 10 枚, 其中 5 枚与花瓣近等长, 5 枚较短, 鳞片矩圆形。蒴果近球形或卵状球形, 长宽近相等, 长 2—4.5 厘米, 宽 2—4 厘米, 翅宽 5—12 毫米, 膜质。种子斜披针形, 长 5—9 毫米, 宽 2—3 毫米, 稍扁, 黄色或灰绿色。花期 4—5 月, 果期 5—8 月。

分布于新疆。生于低山、河流阶地。中亚也有分布。模式标本产于我国额尔齐斯河流域, 存圣彼得堡。

17b. **小叶大翅驼蹄瓣** (变种)

var. **microphyllum** Boriss. in Schischk. et Bobr. Fl. URSS **14**: 183. 1949; 中国沙漠植物志 **2**: 318. 1987.

小叶较小, 倒卵形或椭圆形, 长 4—6 毫米, 宽 2—3 毫米。

分布于新疆。生于荒漠戈壁。中亚有分布。

4. 霸王属 *Sarcozygium* Bunge

Bunge in Linnaea, **17**: 7. 1843; Engl. Pflanzefam. **19**, a: 1931. — *Zygophyllum* L. Subgen. *Euzygophyllum* Popov in Bull. Univ. Asie Centr. **12**: 105 1926. — *Zygophyllum* L. Subgen. *Sarcozygium* (Bunge) Boriss. in Fl. URSS **14**: 184. 1949.



图版 40 1—2. 蝎虎驼蹄瓣 *Zygochloa mucronatum* Maxim. ; 1. 果枝; 2. 花。3—4. 大花驼蹄瓣 *Zygochloa potaninii* Maxim. ; 3. 果枝; 4. 花。5—6. 翼果驼蹄瓣 *Zygochloa pterocarpum* Bunge; 5. 果枝; 6. 花。7. 大翅驼蹄瓣 *Zygochloa macropterum* C. A. May. ; 7. 果枝。(蒋兆兰绘)