

小叶薄纸质，叶背仅叶脉被疏柔毛。雌花序上的花彼此疏离，花瓣长约4毫米，内面被疏毛或几无毛；果梗纤细且延长。

产于广东北部、广西东北部、湖南西南部、贵州东南部。生于山坡草丛或林缘。有栽种。

模式标本采自广东连县。

7c. 石虎 (变种)

var. **officinalis** (Dode) Huang in Acta Phytotax. Sin. 6: 114. 1957. — *Evodia officinalis* Dode in Bull. Soc. Bot. Fr. 55: 703. 1908. — *E. compacta* var. *meionocarpa* Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 627. 1933. — *E. rutaecarpa* f. *meionocarpa* (Hand.-Mazz.) Huang, l. c. 6: 112. 1957.

小叶纸质，宽稀超过5厘米，叶背密被长毛，油点大；果序上的果较少，彼此密集或较疏松。

长江以南、五岭以北的东部及中部各省。生于低海拔地方，浙江、江苏、江西一带多为栽种。

模式标本采自四川南充。

8. 硬毛吴萸

Evodia hirsutifolia Hayata, Ic. Pl. Form. 6: 1916; Kanehira, Form. Trees 311, f. 266. 1936; Huang in Acta Phytotax. Sin. 6: 107. 1957.

乔木，高10—20米；当年生枝褐紫色，与小叶片及花序均被长而略粗的毛。叶有小叶9—11片；小叶卵形至卵状披针形，位于叶轴基部的较小，长5—8厘米，宽2—3厘米，顶部长渐尖，基部狭楔尖，顶部中央一片最大，位于叶轴基部的小叶略不对称；小叶柄甚短或几无柄，小叶片面被甚短的微粗毛或无毛，背面密被毛，散生棕色油点，两面稍不同色；侧脉每边15—18条，被微毛。花序顶生及腋生。果序长约6厘米，宽8—9厘米；果长约6毫米，果梗伸长，分果瓣密布粗大油点；种子长约3毫米，宽约2.5毫米。

产台湾各地及福建沿海地区。见于低至中海拔阔叶林中。

模式标本采自台湾北部。

9. 密果吴萸 野吴萸、野茶辣 (湖北、广西)

Evodia compacta Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 627. 1933; Huang in Acta Phytotax. Sin. 6: 109. 1957; Hartley in Gard. Bull. Sing. 34: 117. 1981, pro syn. sub. *Tetradio ruticarpo*.

小乔木，高约3米。当年枝暗紫红色，无毛或几无毛。小叶干后暗红褐色，常略显皱折。叶有小叶5—9片，小叶纸质，全缘，卵状椭圆形或披针形，位于叶轴下部的通常卵形，长6—16厘米，宽2—6厘米，顶部长渐尖，基部宽楔形，位于叶轴较上部的两侧略不对称，嫩叶叶面略被疏毛，沿中脉被甚短细毛，叶背灰绿色，沿中脉被疏柔毛或无毛，侧脉每边6—12条，干后在叶面微凸起，散生油点；小叶柄长1—3毫米，顶部小叶的叶柄长达2厘米。花序顶生，雄花序长5—7厘米，宽6—10厘米，雌花序长4—6厘米，花