

南至五岭南坡附近，东南至台湾，西南至西藏东南部。

属的模式种：*Boenninghausenia albiflora* (Hook.) Reichb. ex Meisn. (*Ruta albiflora* Hook.)

染色体数 $X=9$, $2n=18$ 。

分种检索表

1. 有子房柄，子房柄长4—8毫米；小叶片长1—2.5厘米。

2. 各部无毛 1a. 臭节草 *B. albiflora* (Hook.) Reichb. ex Meisn. var. *albiflora*

2. 嫩叶叶轴、有时花序轴被疏柔毛，结果时果序轴的毛几脱净

..... 1b. 毛臭节草 *B. albiflora* var. *pilosa* Tan

1. 子房无柄；小叶片长不到1厘米 2. 石椒草 *B. sessilicarpa* Lévl.

1. 臭节草 (植物名实图考) 松风草、生风草、小黄药、白虎草、石胡椒、松气草、老蛇骚、蛇皮草、蛇根草、蛇盘草、臭虫草、断根草、烫伤草 图版 18: 1—4

Boenninghausenia albiflora (Hook.) Reichb. ex Meisn. Conspect. 197. 1828; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 486. 1875; Hayata, Ic. Pl. Form. 1: 116. 1911; Engl. Nat. Pflanzenfam. 19a: 243, f. 103, B—F. 1931; Huang in Acta Phytotax. Sin. 6: 134. 1957; 中国高等植物图鉴 2: 549. 图 2828. 1972; 台湾植物志 3: 507. 1977. — *Ruta albiflora* Hook. Exot. Fl. t. 79. 1823. — *Bodinieria thalictrifolia* Lévl. et Vant in Bull. Acad. Intern. Georg. Bot. 11: 48. 1902. — *Boenninghausenia schizocarpa* S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. 32: 391. 1951.


1a. 臭节草 (原变种)

var. *albiflora*

常绿草本，分枝甚多，枝、叶灰绿色，稀紫红色，嫩枝的髓部大而空心，小枝多。叶薄纸质，小裂片倒卵形、菱形或椭圆形，长1—2.5厘米，宽0.5—2厘米，背面灰绿色，老叶常变褐红色。花序有花甚多，花枝纤细，基部有小叶；萼片长约1毫米；花瓣白色，有时顶部桃红色，长圆形或倒卵状长圆形，长6—9毫米，有透明油点；8枚雄蕊长短相间，花丝白色，花药红褐色；子房绿色，基部有细柄。分果瓣长约5毫米，子房柄在结果时长4—8毫米，每分果瓣有种子4粒，稀3或5粒；种子肾形，长约1毫米，褐黑色，表面有细瘤状凸体。花果期7—11月。

产长江以南各地，南至广东北部，东南至台湾，西南至西藏东南部。见于安徽、江苏、浙江、江西、湖南、广东、广西一带的常生于海拔700—1000米的山地；见于四川、云南和西藏的多生于海拔1500—2800米山地草丛中或疏林下，土山或石岩山地均有。缅甸、锡金、不丹、尼泊尔、印度等也有。

本种分布的东限至日本南部，据观察，产日本南部的其染色体数不同，认为是一变种。



图版 18 1—4. 臭节草 *Boenninghausenia albiflora* (Hook.) Reichb. ex Meisn.: 1. 植株, 2. 花, 3. 果, 4. 种子。5—6. 石椒草 *Boenninghausenia sessilicarpa* Lévl.: 5. 叶片, 6. 果。(余汉平绘)