

根皮土黄色，味苦。全草作草药，味辛，苦。性温或寒（参加石椒草）。清热，散瘀，凉血，舒筋，消炎。治风寒感冒、咽喉炎、腮腺炎、支气管炎、皮下瘀血等。又作驱虫药。

茎、叶含精油，主含： β -myrcene、 α -phellandrene、 β -caryophyllene、cadinene、caryophyllene osides。全株含黄酮类化合物。又含 acridones 类生物碱。

1b. 毛臭节草（变种）

var. *pilosa* Tan in Bull. Bot. Res. 9(2): 47. 1989.

叶柄、叶轴及小叶背面尤以沿叶脉两侧被疏柔毛；花序轴有疏柔毛，结果时毛渐脱落变无毛。5—9月开花结果。

四川峨眉山（模式标本产地）。见于海拔500—1700米山坡。

2. 石椒草（滇南本草） 石胡椒，蛇皮草，苦黄草，羊不食草 图版18: 5—6

Boenninghausenia sessilicarpa Lévl. in Repert. Sp. Nov. 12: 282. 1913; Hand.—Mazz. Symb. Sin. 7: 628. 1933; Huang in Acta Phytotax. Sin. 6: 135. 1957. — *B. albiflora* (Hook.) Meisn. var. *brevipes* Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 33: 450. 1886 et Pl. Delav. 123. 1889; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 14: 225. 1933 et 18: 210. 1937. — *B. brevipes* Lévl. Cat. Pl. Yunnan 249. 1917.

与臭节草之区别在于小叶较小，长3—8毫米，宽2—6毫米；子房无柄。花果期与臭节草相同。

云南东北部（模式标本采自东川县）、四川西南部。生境与臭节草相同但见于海拔较高的山地。

本种亦作草药。据兰茂《滇南本草》载：“味苦寒，有小毒，走经络，治腹胀痛、寒冷胃气疼痛……”。


6. 拟芸香属* *Haplophyllum* A. Juss.

A. Juss. in Mem. Mus. Hist. Nat. Paris 12: 464. 528, t. 17, no. 10. 1825

(‘*Aplophyllum*’) Orth. et nom. cons.

多年生宿根草本或为矮小灌木。茎基部木质，各部密生透明油点，分枝多。单叶，叶全缘，几无柄，支脉不明显。花黄色，两性，顶生聚伞花序，很少单花顶生；萼片及花瓣均5片；萼片基部合生，细小；花瓣全缘，覆瓦状排列；雄蕊10或8枚，等长，花丝中部以下增宽，被疏长毛，药隔顶端有1油点；子房由5—2个心皮组成，通常2—4室，每室有上下叠生的胚珠2颗，花柱细长，柱头小圆球状，花盘小。成熟果（蓇葖）开裂为5

* 亦作假芸香属（刘慎谔等《东北植物检索表》1959）及单叶芸香属（侯宽昭《中国种子植物科属辞典》，后一名称，过于冗长，不足取。



图版 18 1—4. 臭节草 *Boenninghausenia albiflora* (Hook.) Reichb. ex Meisn.: 1. 植株, 2. 花, 3. 果, 4. 种子。5—6. 石椒草 *Boenninghausenia sessilicarpa* Lévl.: 5. 叶片, 6. 果。(余汉平绘)