

乔木或灌木。果为浆果（或称柑果），具革质的外果皮，或具硬质的果壳，在柑橘族中通常有由心皮壁分生出来的含有汁液的汁胞形成的果肉。种子无胚乳，有时具2个或更多个珠心胚（假胚）。叶、枝皮均具裂溶生的油腺。

2族，6亚族，33属（Engler包括1族2亚族29属）。分布于亚洲热带、亚热带以及大洋洲东部和非洲热带地区。我国有2族，5亚族，12属。

17. 小芸木属* *Micromelum* Bl.

Bl. *Bijdragen* 1: 137. 20. 1825. nom. cons. (*Aulacia* Lour. Fl. Cochinch.

1: 273. 1790)

灌木或很少乔木，无刺。枝及叶柄常有较大且微凸起的油点。奇数羽状复叶，互生，小叶片通常明显不对称，密生透明油点。聚伞圆锥花序或近于平顶的伞房状聚伞花序；花两性，花蕾阔卵形或椭圆形；萼片及花瓣均5片；萼片下部合生；花瓣镊合状排列；雄蕊10枚，花丝分离，长短相间，着生于明显凸起的花盘基部四周；子房常被毛，3—5室，每室有上下叠置的2胚珠，花柱通常比子房略长，早落，柱头头状。浆果，多少含粘胶质液，有油点，有种子1或2粒，隔膜螺旋状扭转；种皮膜质，子叶叶状，厚纸质，反复褶皱，胚根长。

约10种，分布亚洲热带和亚热带地区。我国有2种及1变种。分布于广东、广西、云南三省区的南部、西藏东南部、海南。

属的模式种：*Micromelum pubescens* Bl.

染色体数 $X=9$, $2n=18$ 。

分种检索表

1. 花蕾圆球形，花瓣长3—4毫米，外面无毛或有灰黄色短毛；小叶宽1.2—3.5厘米，很少达4.5厘米，叶缘有不规则但明显的锯齿状裂齿或波浪状 1. 大管 *M. falcatum* (Lour.) Tanaka
1. 花蕾长椭圆形，花瓣长5毫米以上，外面密被毛；小叶宽4厘米以上，生于叶轴下部的宽约3厘米以内，叶缘有圆或钝裂齿，或波浪状或全缘。
 2. 植株的幼嫩部分密被黄灰或灰棕色短伏毛 2a. 小芸木 *M. integerrimum* (Buch.-Ham.) Roem. var. *integerrimum*
 2. 植株的幼嫩部分被黄至棕色劲直或扩展且略粗的毛 2b. 毛叶小芸木 *M. integerrimum* var. *mollissimum* Tanaka

1. 大管（植物分类学报） 白木、鸡卵黄、山黄皮、野黄皮 图版 28: 1—5

Micromelum falcatum (Lour.) Tanaka in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, ser. 2, 2: 157.

* 又称小苹果属（中国植物科属检索表）。