

1930; Swingle in Webb. et Batc. Citrus Indust. 1: 146, f. 25c. 1943; Huang in Acta Phytotax. Sin. 8: 71. 1959; 海南植物志 3: 39, 图 551. 1974. — *Aulacia falcata* Lour. Fl. Cochinch. 273. 1790.

树高 1—3 米。小枝、叶柄及花序轴均被长直毛，小叶背面被毛较密，成长叶仅叶脉被毛，很少几无毛。羽状复叶，有小叶 5—11 片，小叶片互生，小叶柄长 3—7 毫米，小叶片镰刀状披针形，位于叶轴下部的有时为卵形，长 4—9 厘米，宽 2—4 厘米，顶部弯斜的长渐尖，基部一侧圆，另一侧偏斜，两侧甚不对称，叶缘锯齿状或波浪状，侧脉每边 5—7 条，与中脉夹成锐角斜向上伸展至几达叶缘，干后常微凹陷，花序顶生，多花，花白色，花蕾圆或椭圆形；花萼浅杯状，萼裂片阔三角形，长不及 1 毫米；花瓣长圆形，长约 4 毫米，外面被直毛，盛花时反卷；雄蕊 10 枚，长短相间，长的约与花瓣等长，另 5 枚约与子房等高；花柱圆柱状，比子房长，子房密被长直毛，柱头头状，花盘细小。浆果椭圆形或倒卵形，长 8—10 毫米，厚 7—9 毫米，成熟过程中由绿色转橙黄、最后朱红色，果皮散生透明油点，有种子 1 或 2 粒。花蕾期 10—12 月，盛花期 1—4 月，果期 6—8 月。

产广东西南部、海南、广西合浦至东兴一带、云南东南部。生于平地至海拔 500 米山地，常见于阳光充足的灌木丛中或阴生林中，树边及路旁也有。越南、老挝、柬埔寨、泰国也有。

花有令人不甚愉快的香气。果序上的果因成熟程度不同，有绿色的、橙色的、朱红色的同时存在。

根的内皮淡茶褐色，嚼之有粘胶质液，味苦。根、叶用作草药。性凉。行气，散瘀，活血。治跌打扭伤（用根浸酒外擦）、胸痹（用根）、感冒（用叶）。

2. 小芸木 (植物分类学报) 山黄皮、鸡屎果 (广西)，半边枫

Micromelum integerrimum (Buch.-Ham.) Roem. Syn. Monogr. 1: 47. 1846; Swingle in Webb. et Batc. Citrus Indust. 1: 146, f. 25c. 1943; Huang in Acta Phytotax. Sin. 8: 72. 1959. — *Bergera integerrima* Buch.-Ham. ex Coleb. in Trans. Linn. Soc. Lond. 15: 367. 1827.

2a. 小芸木 (原变种) 图版 28: 6—8

var. *integerrimum*

高达 8 米的小乔木，胸径 10—15 厘米。树皮灰色，平滑，当年生枝、叶轴、花序轴均绿色，密被短伏毛，花萼、花瓣背面及嫩叶两面亦被毛，成长叶无毛。叶有小叶 7—15 片，小叶互生或近对生，两面同色，深绿，叶片平展，斜卵状椭圆形，斜披针形，有时斜卵形，位于叶轴基部的较小，长约 4 厘米，位于叶轴上部的长达 20 厘米，宽 8 厘米，边全缘，但波浪状起伏，两侧不对称，一侧圆，另一侧楔尖，侧脉稍凹陷，不分枝；叶柄基部增粗；小叶柄长 2—5 毫米。花蕾淡绿色，长椭圆形，花开放时花瓣淡黄白色；花萼浅杯状，裂片长 1 毫米；花瓣长 5—10 毫米，盛开时反折；雄蕊 10 枚，长短相间，长的约与花瓣等长；子房初时被直立的柔毛，花后毛脱落，基部有明显凸起的花盘，花柱几与子