

厘米，顶部短尖至渐尖，有时钝，基部楔尖，无毛，全缘，干后不规则浅波浪状起伏，且暗淡无光泽，中脉在叶面平坦或微凸起，或下半段微凹陷，侧脉颇明显。圆锥花序腋生及顶生，通常 3—5 厘米，很少较短，但顶生的长可达 14 厘米；花序轴、花梗及萼片常被早脱落的褐锈色微柔毛；萼裂片卵形，端钝，宽约 1 毫米；花瓣白色，长约 4 毫米，长椭圆形，较迟脱落，干后变淡褐色，边缘淡黄色；雄蕊 10 枚，极少 8 枚，花丝略不等长，上部宽阔，下部稍狭窄，与花药接连处突尖，药隔顶端有 1 油点；子房阔卵形至圆球形，油点不凸起，花柱极短，柱头稍增粗，子房柄略升起。果圆球形或椭圆形，径 10—15 毫米，淡黄白色转淡红色或暗朱红色，半透明，油点明显，有种子 3—2，稀 1 粒。花期 3—5 月，果期 7—9 月。通常除冬、春初季节外常在同一树上有成熟果也同时开花。

产台湾、福建、广东、广西、贵州、云南六省区的南部及海南。生于低海拔缓坡或山地杂木林，路旁树下的灌木丛中亦常见，很少见于海拔达 1000 米的山地。越南东北部也有。百余年来先后被引种至欧洲及美洲各地。

模式标本采自广东（广州或湛江近郊）。

果略甜，轻度麻舌。根及叶作草药，味苦，微辛，气香，性平。根行气消积，化痰止咳；叶有散瘀消肿功效。

在同一花序中有个别花的雄蕊为 8 枚，或更有 5 枚的。采自广东及广西东南部的标本，其小叶在干状态下沿中脉两侧有形状不规则的茶褐色细斑纹，在放大镜下清晰可见。

11. 墨脱山小橘

Glycosmis motuoensis Tao in Acta Bot. Yunnan. 6: 286. 1984.

灌木或小乔木，高 3 米。小枝灰青色，无毛。叶有小叶 3—4 片，小叶互生或近对生，阔卵形或倒卵状椭圆形，长 12—20 厘米，宽 5—9 厘米，顶部突狭的短尖，基部楔尖，全缘或浅波浪状，近革质，叶面暗绿，叶背浅绿；小叶柄长 4—10 毫米。花序腋生，长 2.5—4 厘米；花序轴被褐锈色短毛；萼裂片阔卵形，长不及 2 毫米，外面被褐锈色短毛，边缘被缘毛；花瓣长圆形，长约 1.5 毫米，端钝，无毛；雄蕊 10 枚，近等长，花丝略扁平，花药椭圆形，药隔无油点，顶端尖；子房近球形，花柱圆柱状，柱头不增大。果未见。

产西藏东南部（墨脱）。生于海拔约 800 米山坡林中。

模式标本采自西藏墨脱。

本种与 *G. boreana* Narayan. 很近似，材料不全，留后研究。

19. 黄皮属 *Clausena* Burm. f.

Burm. f. Fl. Ind. 87, t. 29, f. 2. 1768 (“*Claucens*”)

无刺灌木或乔木。各部常有油点，小枝及花序轴常兼有丛状短毛。奇数羽状复叶，小叶两侧不对称。圆锥花序；花两性，花蕾圆球形，稀卵形；花萼 5 或 4 裂，花瓣 5 或 4