

通常渐狭长或渐尖，基部短尖或狭楔尖，全缘，侧脉多，明显；叶柄长3—6，很少达8毫米，腹面有小浅凹沟。花序腋生，总状，有花3—9朵（很少更多？），花径10—15毫米；萼裂片4，阔卵形，长约2毫米；花瓣白色，长8—10毫米；雄蕊8枚，比花瓣略短，花丝宽但顶端针尖状，有时2枚合生，但通常分离；花柱长约4—5毫米，柱头头状，子房椭圆形，顶部狭，无大油点，花盘隆起。果圆球形，径1.2—1.5厘米，油胞大而密，干后凹点显著，3—4室，种子2—1粒。花期5月，果期10月。

产广西西部（靖西、大新、那坡）、云南东南部（富宁）。生于海拔700—850米山地疏林或灌木丛中，常见于石灰岩山地。越南北部也有。

7. 封开酒饼簕

Atalantia fongkaica Huang in *Guihia* 11: 5. 1991.

高约1米的灌木。枝、叶均无毛，小枝有时有甚短的刺，当年生枝绿色，稍两侧压扁。叶革质或硬纸质，形状多样，若倒卵形，则长7—9厘米，宽3—4厘米，顶部突急尖，尖头甚短，若为倒披针形或长圆形，则长10—16厘米，宽4—6厘米，顶部渐尖，基部宽楔形或钝，中脉在叶面凸起，侧脉多数，支脉明显，结成网状，边全缘，波浪状，或上半段有细钝裂齿，干后叶背灰黄或黄灰色；叶柄长4—7毫米，有关节。果单个腋生，果梗长5—7毫米，径1.5—2毫米，幼果梨形，成熟果椭圆形或卵形，长约38毫米，宽30毫米，果皮厚约2毫米，表面平滑，干后油点稍凸起，5室，每室有1种子；种子长15—18毫米，宽10—13毫米，种皮平滑，子叶绿色，单胚。果期8—10月。

产广东封开（黑石顶），生于海拔约200米以下山谷溪旁。

模式标本采自广东封开黑石顶。

24. 枳属* *Poncirus* Raf.

Raf. *Sylva*. Tellur. 143. 1838.

落叶或常绿小乔木或通常灌木状。分枝多，刺多且长，枝常曲折，有二型：一为正常枝，或称长梢，其节间与叶柄近于等长或较长；另一为短枝，或称短梢，是由上年生枝的休眠芽发育成长，有正常叶1—5片。指状3出叶，偶有单叶或2小叶，幼苗期的叶常为单叶及单小叶。花单生或2—3朵簇生于节上，花芽于上年生的枝条形成，花两性；萼裂片及花瓣均5片；萼片下部合生；花瓣覆瓦状排列，很少4或6片；雄蕊为花瓣数的4倍或与花瓣同数，花丝分离；子房被毛，6—8室，每室有排成二列的胚珠4—8颗，花柱短而粗，柱头头状。浆果具瓢囊和有柄的汁胞，又称柑果，柑果通常圆球形，淡黄色，密被短柔毛，很少儿无毛，油点多；种子多饱满，大，种皮平滑，子叶及胚均乳白色，单及多胚，种子发芽时子叶不出土。

* 又称“枸橼属”（陈嵘：中国树木分类学）。