

果扁圆形，果顶略凹，无柱突，纵横径 2.5—4.5 厘米×3.5—5.5 厘米，重 40—60 克，深橙黄至橙红色，平滑，光亮，皮厚 2—3 毫米，瓢囊 8—9 瓣，汁少味甜，不甚化渣，回味微带苦；种子约 15 粒。果期 10 月上旬。属朱橘类。

主产江苏洞庭山一带。

(10) 椪橘

cv. *Tardiferax* *C. tardiferax* Tanaka.

果短圆锥形或扁圆形，果顶微凹，蒂部略隆起，纵横径约 5.5 厘米×6.8 厘米或更大，重 80—140 克，深橙黄色，皮厚 3.5 毫米，果心大而空，瓢囊 9—10 瓣，果肉嫩，汁多，初熟时味偏酸，贮藏后变甜；种子约 10 粒，单胚。果期 11 月下旬。

主产浙江（黄岩）。

(11) 早橘 黄岩蜜橘

cv. *Subcompressa* *C. subcompressa* Tanaka, *C. nobilis* var. *subcompressa* Hu.

果扁圆形，果顶浅凹，蒂部有纵沟纹，纵横径 3.6—4.5 厘米×4.9—7.5 厘米，重 70—100 克，橙黄色，皮厚 1.5 毫米，光滑，瓢囊 8—11 瓣，果肉淡橙黄色，味甜，风味略淡；种子约 14 粒，多胚。果期 10 月中下旬。

主产浙江（黄岩等地）。

是早熟品系，不耐贮，贮藏 2 个月后，果汁减少，味变淡。

(12) 南丰蜜橘

cv. *Kinokuni* *C. kinokuni* Tanaka, *Sinocitrus kinokuni* (Tanaka) Tseng.

果扁圆形，果顶平或微凹，有小柱突或无，果蒂部常隆起，有肋纹，或平而无肋纹，纵横径 2.8—3.8 厘米×3.9—5.0 厘米，重 25—50 克，橙红色，皮厚 1.7—2.3 毫米，瓢囊 9—10 瓣，果肉深橙黄色，细嫩，多汁，味浓甜，通常无种子。果期 11—12 月。

主产江西南丰等各地。其他省区少量栽种。

有 3 个品系，大叶系的果最大，小叶系的果最小，但味最甜，高蒂系的果蒂部隆起。

南丰蜜橘被认为是乳橘系，浙江黄岩的乳橘与它很近似，在浙江又称茆橘、金钱蜜橘、金钱橘或乳柑。福建的邵武蜜橘等都属于此类。它的栽培史有一千三百年以上。果形小，皮薄，橙黄色，味甜，无或少籽。

(13) 福橘

cv. *Tangerina* *C. tangerina* Tanaka, *Sinocitrus tangerina* (Tanaka) Tseng.

果扁圆形，果顶部凹陷，蒂部四周常有放射沟，纵横径 5.8—6.0 厘米×6.4—7.5 厘米，重 100—140 克，大红至深红色，皮厚 1.8—2.4 毫米，质脆，果心大而空，瓢囊 9—12 瓣，果肉暗红至紫红色，甜稍带酸，不甚化渣；种子 16—25 粒，多胚。果期 11 月。

主产福建（福州、漳州地区）。长江两岸各省区多栽种。

福橘是红橘的典型代表，浙江的漳橘、湖北的川橘等都属此类。品系多，有大果与小果，扁果与圆果，厚皮与薄皮等系。漳橘的果皮较厚且粗糙，颜色鲜红，与福橘有差异。