

黄色柔毛，后疏被柔毛或无毛；花直径2—3毫米，花萼外面被短柔毛；花瓣匙形，被短柔毛，比雄蕊长；雄花花盘扁球形，雌花花盘浅盘形；子房密被柔毛。核果卵圆形，长8—12毫米，直径6—8毫米，无毛，干后红褐色，有浅网纹。花期3—4月，果期8—10月。

产广西、广东及云南南部地区；见于山地疏林、密林中，或路边灌丛中，海拔750—1200（—1850）米。分布于印度、锡金、不丹、中南半岛、马来西亚和菲律宾。

4. 海人树属 *Suriana* Linn.

Linn. Sp. Pl. 284. 1753.

灌木或小乔木；嫩枝有毛，部分为头状腺毛；无苦味。叶为单叶，互生；无托叶。花两性，5基数，数朵组成腋生的聚伞花序，很少单生；花梗基部具关节；苞片宿存，叶状；萼片基部合生；花瓣与萼片同数，均为覆瓦状排列；雄蕊10，有时5枚不发育，花药丁字着生；花盘不发育；心皮5，分离，花柱丝状，直立，每心皮1枚，柱头小而不明显；每心皮具2胚珠，并列，基底着生，珠孔朝向基部。果为核果状，3—5个聚生，被宿存花萼所包；种子1颗，胚弯曲，无胚乳。

仅1种，产热带地区，主要分布于太平洋至印度洋中的小孤岛或珊瑚岛上。我国见于台湾及西沙群岛等地。

属模式种：海人树 *Suriana maritima* Linn.

1. 海人树（中国种子植物科属词典） 滨樗（中国科学院华南植物研究所集刊）

图版4：1—4

Suriana maritima Linn. Sp. Pl. 284. 1753; DC. Prodr. 2: 91. 1824; Benth. Fl. Austr. 1: 375. 1863; Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 522. 1875; Engl. in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (4): 209, fig. 199. 1879; Nooteboom in Steen. Fl. Mal. ser. 1, 6 (2): 196. 1962; 中国科学院华南植物研究所集刊 1: 143. 1983.

灌木或小乔木，高1—3米，嫩枝密被柔毛及头状腺毛；分枝密，小枝常有小瘤状的疤痕。叶具极短的柄，常聚生在小枝的顶部，稍带肉质，线状匙形，长2.5—3.5厘米，宽约0.5厘米，先端钝，基部渐狭，全缘，叶脉不明显。聚伞花序腋生，有花2—4朵；苞片披针形，长4—9毫米，宽1—1.5毫米，被柔毛；花梗长约1厘米，有柔毛；萼片卵状披针形或卵状长圆形，长5—10毫米，宽2—4毫米，有毛；花瓣黄色，覆瓦状排列，倒卵状长圆形或圆形，具短爪，脱落；花丝基部被绢毛，长5毫米；心皮有毛，倒卵状球形，花柱无毛，长5毫米，柱头小而明显。果有毛，近球形，长约3.5毫米，具宿存花柱。花果期夏秋。

产台湾及西沙群岛等地；生于海岛边缘的沙地或石缝中。分布于印度、印度尼西亚、