

Garuga floribunda Decne. Nouv. Ann. Mus. Paris 3: 477. 1834; Engl. in DC, Monogr. Phan. 4: 6. 1883; Lam in Bull. Jard. Bot. Buitenz., ser. 3 (12): 326, fig. 7a. 1932; Gretzou in Fedde, Repert. Sp. Nov. 36: 265. 1934; Lam in Back. Fl. Jav. 6B: 3. 1948; Kalkm. in Blumea 7 (2): 463, fig. 3 a. 1953.

2a. 南洋白头树 (原变种)

var. ***floribunda***

分布于马来西亚 (沙捞越)、菲律宾、印度尼西亚，经大洋洲东北部至西太平洋群岛，我国不产。

2b. 多花白头树 (云南植物志) 八角楠 (海南) 图版 6: 15—16

var. ***gamblei*** (King ex Smith) Kalkm. in Blumea 7 (2): 466, fig. 3 b. 1953; 云南植物志 1: 195, 图版 45: 15—16. 1977; 云南种子植物名录, 上册 826, 1984. — *Garuga gamblei* King ex Smith in Rec. Bot. Surv. India 4: 262. 1911; Gamble, Fl. Pres. Madras 1: 169. 1915; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 14 (1): 17. 1935 (sub *G. pinnata*).

乔木，高 20—26 米；小枝除幼嫩部分外无毛，有明显的叶痕。叶有小叶 9—19，叶轴及小叶中脉疏被细柔毛，余无毛；最下一对小叶常过渡为托叶，长圆形，长 0.5—0.8 厘米；小叶椭圆形至长披针形，膜质至坚纸质，侧脉 15—20 对，基部圆形，偏斜，边缘具疏锯齿，无小托叶，中间一对长 9—11 厘米，宽 3—5 厘米；顶生小叶柄长 0.6—2.5 厘米。圆锥花序侧生和腋生，长 25—35 厘米，集于小枝近顶部，被细柔毛至无毛；花黄色，长 0.4—0.6 厘米；花托杯状，外被柔毛；萼片三角形，外被柔毛；花瓣长圆披针形，长约 0.3 厘米，两面被细柔毛；雄蕊基部被柔毛；花盘裂片三角形至四方形；子房球形，具短柄，被绒毛；花柱被绒毛或疏柔毛，柱头 5 浅裂。果近球形，长 0.5—0.9 厘米，直径 0.5—1.2 厘米，基部无宿存的花萼。花期 5 月，果期 8—9 月。


产广东、广西、海南和云南南部；生于海拔 200—900 米的密林中。分布于印度、锡金、孟加拉。

本种木材供做高级家具用。

3. 光叶白头树 (云南植物志) 图版 6: 17—18

Garuga pierrei Guill. Rev. Gén. Bot. 19. 1907, et Lecomte, Fl. Gén. Indo-chine 1: 719. 1911, et Suppl. 1: 682. 1946; Lam in Bull. Jard. Bot. Buitenz. ser. 3 (12): 331, fig. 7 c. 1932; Kalkm. in Blumea 7 (2): 467, fig. 3 c. 1953; 云南植物志 1: 195, 图版 45: 17—18. 1977; 云南种子植物名录, 上册 826, 1984. — *Garuga pinnata* Roxb. var. *pierrei* (Guill.) Gretzou, Acta Fauna et Flora Univ., ser. 2, 1 (9): 6. 1936.

乔木，高 8—15 米，树皮绿褐色。叶有小叶 11—17，叶轴及小叶片被短的细柔毛；最



图版 6 1—7. 马蹄果 *Protium serratum* (Wall. ex Colebr.) Engl. : 1. 果枝, 2. 花苞, 3. 花, 4. 雄蕊, 5. 果, 6. 核, 7. 胚。8—9. 滇马蹄果 *Pyunnanense* (Hu) Kalkm. : 8. 小叶片, 9. 果。10—14. 白头树 *Garuga forrestii* W. W. Smith: 10. 果枝, 11. 果序之一部分, 12. 花纵剖, 13. 果, 14. 果横切面。15—16. 多花白头树 *G. floribunda* Decne. var. *gamblei* (King ex Smith) Kalkm. : 15. 花纵剖, 16. 果。17—18. 光叶白头树 *G. pierrei* Guill. : 17. 花纵剖, 18. 果。19—20. 羽叶白头树 *G. pinnata* Roxb. : 19. 花纵剖, 20. 果。(曾孝濂绘)