

7. 滇榄 漾蕊 (云南布朗族语), 漾短 (云南傣族语) 图版 8: 8—9

Canarium strictum Roxb. Hort. Bengal. 49. 1814, nom. nud., et Fl. Ind. 138. 1832; Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 534. 1875; Engl. in DC. Monogr. Phan. 4: 118. 1883; King in Journ. As. Soc. Beng. 62 (2): 186, t. 13. 1894; Leenh. in Blumea 9 (2): 414. 1959; 云南植物志 1: 203, 图版 47: 8—9. 1977. — *Pimela stricta* Bl. in Ann. Mus. Bot. Lugd.-Bat. 1: 226. 1850. — *Canarium sikkimense* King in Journ. As. Soc. Beng. 62 (2): 187; t. 11, 12. 1894. — *C. resiniferum* Brace ex King, l. c.: 188. 1894.

大乔木, 高达 50 米, 胸径 1 米, 树皮灰白色。小枝粗 0.5—2.5 厘米, 幼部密被锈色绵毛, 后渐无毛; 髓部具周生的柱状维管束, 中央有散生的维管束。一般无托叶, 稀有托叶, 但极早落, 生叶腋的枝干上。叶有小叶 5—6 对, 被疏柔毛或无毛。小叶卵状披针形至椭圆形, 长 10—20 厘米, 宽 4—6.5 厘米, 坚纸质至革质, 叶面无毛, 背面近无毛至密被锈色绒毛, 基部阔楔形, 偏斜, 先端渐尖至骤狭渐尖, 尖头锐或钝, 边缘具细圆齿或呈微波状, 侧脉 20—22 对, 两面多少明显凸起。花序腋生, 有时集为假顶生, 狭聚伞圆锥花序, 雌花序常为总状, 密被锈色绵毛至略被黄色绒毛, 后渐无毛, 雄花序长 15—40 厘米, 为多花的团伞花序; 雌花序长 7—20 厘米, 少花。雄花长 7 毫米, 雌花长 9 毫米。花萼近无毛至外被锈色绵毛, 在雄花中长 4 毫米, 在雌花中长 5.5 毫米, 均有短而钝的裂片; 花瓣外面近无毛至密被伏柔毛; 雄蕊 6, 无毛; 花丝合生 $1/4$ 至 $3/4$; 花药渐尖; 花盘边缘和内侧被长柔毛, 在雄花中环状, 高 1 毫米, 在雌花中微 6 裂, 高 0.5 毫米, 肉质; 雌蕊无毛或被星散的伏毛; 在雄花中几乎不存在。果序总状, 长 10—20 厘米, 无毛, 有果 1—3, 果具柄, 果萼盘状, 微 3 裂, 或呈三角状, 直径 1.25 厘米; 果倒卵圆形或椭圆形, 横切面近圆形至圆三角形, 两端钝, 长 3.5—4.5 厘米, 宽 1.7—2.3 厘米; 果核光滑, 肋角钝, 核盖具不明显的中肋, 盖厚 2.5 毫米; 能育室 1 (—2), 不育室多少退化。果 4—5 月成熟。

产云南西双版纳。分布于印度南部及东北部、锡金、缅甸北部。

果可生食。种子可榨油。树脂棕褐色, 状如松脂, 可用人工方法采割, 当地居民用以点灯照明。



图版 8 1—5. 方榄 *Canarium bengalense* Roxb. : 1. 果枝, 2. 叶柄基部, 示托叶痕, 3—4. 两种外形的果及其横切面, 5. 果核, 6—7. 毛叶榄 *C. subulatum* Guill. : 6. 果, 7. 果横切面, 8—9. 滇榄 *C. strictum* Roxb. :

8. 果, 9. 果横切面。(曾孝濂绘)